

THERON®**Acaricida***Concentrado emulsionable*

ACCIÓN FITOSANITARIA: THERON® es un acaricida selectivo no sistémico de largo efecto residual que puede combatir especialmente huevos pero también ninfas y larvas de distintas especies de ácaros en cultivos ornamentales.

NOMBRE COMÚN: Tetradifon.

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: Emulsión concentrada que contiene 80 g/l de ingrediente activo por litro de producto comercial.

MODO DE ACCIÓN: THERON® es un acaricida no sistémico altamente selectivo, tóxico para huevos y todos los estados fitófagos de ácaros excepto adultos.

MECANISMO DE ACCIÓN: De acción prolongada que penetra a través del tejido de la planta. Presenta la acción de contacto sobre los huevos y todas las fases no adultas, también actúa indirectamente por la esterilización de las hembras, lo que lleva al desarrollo de los huevos no viables.

INSTRUCCIONES DE MANEJO: En la mezcla llenar el tanque de aspersión con la mitad de volumen de agua. Agregar la cantidad de producto requerido y agite.

No aplicar el producto cuando está por llover.

No guardar sobrantes del caldo de aspersión de un día para el otro.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con muchos productos para la protección de cultivos. Solamente mezclar THERON® con productos de formulación de Concentrado emulsionable. No mezclar con surfactante.

Realizar pruebas de compatibilidad previa.

TOXICIDAD: Categoría Toxicológica IV. Cuidado.

FRASES DE ADVERTENCIA: Acaricida de muy baja toxicidad para mamíferos, tóxico para peces, por lo tanto: "No contaminar ríos, arroyos, estanques o lagos con productos químicos de desecho o envases vacíos". "No almacenar en casa de ha-

bitación. "Manténgase alejado de los niños, animales domésticos y alimentos". "Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente, lejos de las bebidas y alimentos para las personas y animales". "No emplear este envase para ningún otro fin". "Antes de destruir el envase enjuagarlo con agua (cuarta parte del contenido) por lo menos tres veces y los residuos viértalos en el equipo de aplicación", inutilizar el envase vacío triturándolo o perforándolo y disponerlo en un lugar apropiado de acuerdo a la normativa local". "En caso de derrame, cubrir el producto con tierra u otro material absorbente, recoger y colocar los residuos en un recipiente adecuado para su eliminación en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin". "No aplique el producto en dirección contraria al viento".

PRECAUCIONES: El producto es dañino si se ingiere y puede ocasionar daño a los ojos.

Durante: La preparación y utilización del producto NO COMER, BEBER o FUMAR.

Evitar: La inhalación e ingestión de la sustancia nebulizada, así como el contacto del producto con la boca, los ojos y la piel.

Usar: Traje protector adecuado, gafas, mascarilla, guantes y botas. Si el manejo del producto concentrado es continuo, usar además mascarilla con filtro.

Antes de COMER, BEBER o FUMAR, sacarse la ropa contaminada y lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua.

PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS: En caso de intoxicación accidental:

Por inhalación: Apartar al accidentado y suministrarle aire puro, manténgale en reposo.

Por contacto con la piel: Despojarse de la ropa contaminada, lavarse o bañarse con abundante agua y jabón.

Por contacto con los ojos: Lávese con abundante agua o suero fisiológico por lo menos durante 15 minutos.

Por ingestión: No provocar el vómito.

ANTÍDOTO: Lavado gástrico (en caso de ingestión), luego carbón activado. DIAZEPAN (en caso de convulsiones) adultos 5-10 mg, niños 0.25-0.45 mg/kg de peso corporal por vía intravenosa lenta. CONSULTAR CON UN MÉDICO Y MOSTRARLE LA ETIQUETA O COMUNICARSE CON EL CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: EN GUAYAQUIL (COSTA) CITOX 04-2451022; EN QUITO (SIERRA) CIATOX 02-2905162.

Para mayor información llamar a ECUAQUÍMICA, telf.: (04) 2 682 050 Guayaquil, (02) 2 861 690 Quito.

PRESENTACIONES:

Frasco x 1 litro.

Galón x 5 litros.

INSTRUCCIONES DE USO DE THERON®:

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO | PLAGA | DOSIS | PC* |
|--------------|----------------------------------|--------------|-----------|
| ORNAMENTALES | Ácaros (<i>Tetranychus</i> sp.) | 1.5 – 2 ml/l | No aplica |

*Periodo de Carencia

Ornamentales: Aplicar dos veces por ciclo con un intervalo de 7 días entre aplicaciones.

Papa: Aplicar el producto por una ocasión cuando exista la presencia de 10 ninfas por plantas.

REGISTRO: 74-A1/NA

FORMULADOR: ADAMA ANDINA.

DISTRIBUIDO POR: ECUAQUÍMICA.