

TRONKAL



Fungicida sistémico

Suspensión concentrada (SC)

COMPOSICIÓN:

Azoxystrobin	200 g/l
Difenoconazole	125 g/l
Aditivos c.s.p.	1 l

MODO DE EMPLEO: TRONKAL es un fungicida potenciado en base a dos ingredientes activos de eficaz acción sobre hongos. Azoxystrobin, potente inhibidor de la germinación de esporas y Difenoconazole inhibidor de la síntesis del ergosterol, del tubo germinativo y la síntesis del ADN del hongo. Ambos de tipo de acción sistémica, combinados generan una acción preventiva y curativa, además de erradicante aplicado en las dosis recomendadas.

MODO DE EMPLEO: Antes de utilizar el producto, agite el envase. Para la preparación, coloque la dosis indicada de **TRONKAL** en el estanque de mezcla con la mitad del volumen de agua aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y complete la cantidad de agua. Si utilizará un surfactante no iónico, mézclelo en el estanque de último y vuelva a agitar la mezcla. **TRONKAL** puede aplicarse con equipo terrestre, aspersores de mochila o equipo accionado por tractor. Asegurarse que los equipos y boquillas estén en buen estado y calibrados para una buena distribución y tamaño de la gota uniforme.

INSTRUCCIONES DE USO DE TRONKAL:

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS (l/ha)	PC (PERIODO DE CARENCIA)
ARROZ (<i>Oryza sativa</i> L.)	Pudrición de la vaina (<i>Sarocladium oryzae</i>)	0.50	28 días
ROSA (<i>Rosa</i> sp.)	Oidio (<i>Oidium</i> sp.)	1.5	N/A

***Volumen de agua:** Arroz. Descarga de 400 litros de agua. Rosa. Descarga de 1 500 litros de agua.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

ARROZ: Debe ser aplicado con niveles iniciales de infección o cuando aparezcan los primeros síntomas. Se debe aplicar en dos ocasiones con intervalos de 7 días.

ROSA: Debe ser aplicado cuando exista la presencia de un 2% de la plaga como mínimo en las plantas. Se debe aplicar en dos ocasiones con intervalos de 7 días.

PERIODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Es recomendable guardar un periodo mínimo de 24 horas para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los que se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad.

RESPONSABILIDAD: “El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.

TOXICIDAD: Categoría Toxicológica II. Moderadamente peligroso. “LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL

PRODUCTO”. “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: Peligroso si es inhalado. Evitar respirar polvo, vapor o aspersión.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). “Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado herméticamente, lejos de las bebidas y de los alimentos para las personas y los animales”. “No emplear este envase para ningún otro fin”.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

- **En caso de inhalación,** conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.
- **En caso de contacto con la piel,** retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.
- **En caso de contacto con los ojos** lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.
- **En caso de ingestión,** no induzca el vómito.

Síntomas: Es posible que se presenten irritaciones dérmicas leves, irritaciones oculares leves a moderadas. En caso de ingestión se produce irritación, salivación, náuseas, vómitos y diarrea. Cefalea, irritabilidad, somnolencia, vértigo.

NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto específico. El tratamiento de la exposición debe estar dirigido al control de los síntomas y la condición clínica del paciente.

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda” EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO. Atención las 24 horas del día.

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

Medidas relativas para la protección del ambiente: **TRONKAL** es Ligeramente tóxico para aves. Moderadamente tóxico para peces y especies acuáticas. “No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos. Realizar las aplicaciones utilizando equipos calibrados con la dosis y volumen de agua recomendadas para evitar el escurrimiento del producto”. “Realizar la aplicación en un suelo a capacidad de campo y con un máximo desarrollo vegetativo en la planta”, “Evitar las aplicaciones cuando el suelo se encuentre saturado o esté lloviendo”.

PRESENTACIONES:

Envase x 250 cc
Envase x 500 cc
Envase x 1 litro

REGISTRO: 143-F3/NA

DISTRIBUIDO POR: FARMAGRO.