

EQUIL[®]



Extracto seco de Tilia 75 mg
Extracto seco de Passiflora incarnata 75 mg
Extracto seco de Valeriana 50 mg
Ciclobenzaprina clorhidrato 2,5 mg
Via oral

Comprimidos recubiertos

FÓRMULA:

Cada comprimido recubierto contiene:

Extracto seco de Tilia sp (equivalente a 0,15 mg de flavonoides)	75 mg
Extracto seco de Passiflora Incarnata (equivalente a 0,45 mg de flavonoides expresados como Isovitexina)	75 mg
Extracto seco de Valeriana sp (equivalente a 0,06 mg de flavonoides expresados como Ácido valerénico)	50 mg
Ciclobenzaprina clorhidrato	2,5 mg

Excipientes (celulosa microcristalina, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, Ludipress[®], Opadry[®] Y-1-18128A, Óxidos de hierro pardo, amarillo y rojo, Polietilenglicol 6000, sílice coloidal hidrófoba) c.s. Contiene aprox. 50 mg de Lactosa monohidrato por comprimido recubierto.

¿QUÉ ES EL EQUIL Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

EQUIL es la combinación de varios componentes naturales y un relajante muscular, que está indicado en los cuadros de estrés, ansiedad, insomnio, en los cuales coexisten tensión y contractura, en los que se desea una acción sedante suave y de relajación, sin efectos secundarios desagradables y sin riesgo de acostumbriamiento.

NO TOMES ESTE MEDICAMENTO: Si es alérgico (hipersensibilidad) a cualquiera de los componentes de la formulación. Niños y adolescentes menores de 15 años.

Por la presencia de la Ciclobenzaprina, se contraindica durante el tratamiento con IMAO hasta 2 semanas después de su suspensión.

Si padece de trastornos del ritmo cardíaco (arritmias cardíacas y trastornos de la conducción como bloqueo auriculoventricular).

Insuficiencia cardíaca congestiva. Hipertiroidismo.

Si está en período de recuperación de un infarto de miocardio.

No debe ser administrado a mujeres embarazadas o en período de lactancia.

TENGA PRECAUCIONES: Por la presencia de la Ciclobenzaprina, químicamente relacionada con los antidepresivos tricíclicos y los parasimpaticolíticos, debe ser utilizado con cuidado en pacientes con antecedentes de retención urinaria, glaucoma de ángulo estrecho, aumento de la presión intraocular o en tratamiento con medicación anticolinérgica.

Administrar con precaución en pacientes con antecedentes de infarto agudo de miocardio, trastornos del ritmo cardíaco, hipertiroidismo e insuficiencia hepática. Este medicamento contiene Lactosa. Si presenta intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o problemas de mala absorción de glucosa o galactosa no debe tomar este medicamento.

EMBARAZO Y LACTANCIA: Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento.

No debe ser administrado a mujeres embarazadas o en período de lactancia.

CONDUCCIÓN Y USO DE MÁQUINAS: La Ciclobenzaprina y el extracto seco de Valeriana pueden disminuir la capacidad mental o física requerida para realizar tareas riesgosas como operar maquinaria o conducir.

USO DE OTROS MEDICAMENTOS: Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica.

Si está en tratamiento con algún otro medicamento sedante, tranquilizante, antialérgicos con efectos sedantes o medicamentos para dormir, consulte a su

médico antes de tomar este medicamento. Por la presencia de la Ciclobenzaprina, la interacción con antidepresivos IMAO s puede ocasionar crisis de hipertermia y convulsiones. Evitar la asociación de este medicamento con antidepresivos del tipo ISRS y tramadol.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS: Al igual que todos los medicamentos, EQUIL puede producir efectos no deseados. En raros casos pueden presentarse mareos, somnolencia, sequedad bucal y faríngea, náuseas, constipación, dispepsia, astenia y fatiga, temblores, visión borrosa, dolor de cabeza, confusión o palpitaciones.

¿Cómo usar EQUIL?

La dosis promedio es de 1 ó 2 comprimidos recubiertos de EQUIL, 2 ó 3 veces por día. La dosis se ajustará según la evolución clínica y de acuerdo a prescripción médica.

En caso de insuficiencia hepática leve comenzar con 2 comprimidos diarios de EQUIL y ajustar el tratamiento según respuesta. No se recomienda el uso en caso de insuficiencia hepática moderada o severa.

En pacientes ancianos comenzar con 2 comprimidos diarios de EQUIL y ajustar el tratamiento según respuesta.

SI OLVIDÓ TOMAR EQUIL: Es importante tomar EQUIL como fue indicado por el médico. Si olvida una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. Si esto sucede cuando es casi la hora para su próxima dosis, tome solamente la dosis habitual en ese momento. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

SI USA MÁS EQUIL DE LO QUE DEBIERA: Ante una sobredosis o ingesta accidental consultar al servicio de emergencia médica y al servicio de información toxicológica de referencia. Debe suministrarse, en la medida de lo posible, el nombre y la cantidad del producto ingerido. Ante una intoxicación puede observarse taquicardia, bradicardia, cambios en el ECG, hipotensión e hipertensión, dolor opresivo en el pecho y fatiga. Como efectos anticolinérgicos sequedad en membranas mucosas, midriasis, insuficiencia respiratoria, letargo, estupor, coma, delirium, alucinaciones, temblores, mioclonías, movimientos coreoatetósicos, disminución de los ruidos hidroaéreos abdominales, náuseas, vómitos, dolor abdominal, retención urinaria y rabdomiólisis.

Instalar tratamiento sintomático y de soporte de las funciones vitales. Está indicado el carbón activado en el corto plazo después de la ingestión y sin depresión de conciencia. No se recomienda la inducción del vómito. En caso de depresión del SNC o respiratoria debe realizarse Intubación Orotraqueal para proteger la vía aérea y realizar soporte ventilatorio. Monitorizar los signos vitales, el estado mental y monitoreo cardíaco continuo en los pacientes sintomáticos. Valorar y tratar hipoxia, alteraciones hidroelectrolítica, acidosis y arritmias. Utilizar benzodiazepinas para tratar el delirium, la agitación y las convulsiones, fluidos intravenosos en caso de hipotensión y fisostigmina como alternativa para revertir los efectos anticolinérgicos, principalmente en el SNC. Tanto la hemodiálisis como la hemoperfusión no son útiles en la intoxicación por este fármaco. No se requiere paraclínica específica en la mayoría de los pacientes. Ante convulsiones y agitación prolongada monitorizar la creatinín-fosfoquinasa (CPK). En caso de rabdomiólisis se debe monitorizar la función renal y el volumen urinario, así como la función hepática en pacientes sintomáticos. La medición de los niveles plasmáticos de los principios activos no es clínicamente útil y tampoco se encuentra disponible.

PRESENTACIÓN:

Cajas conteniendo 20 comprimidos recubiertos.

Venta bajo receta médica.

Producto medicinal.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Conservar a temperatura no mayor a 30 °C.

ACROMAX

Laboratorio Químico Farmacéutico, S. A.