

# MEDICINA DE CANINOS Y FELINOS

Sofía Malo Boza / U.S.F.Q  
9798  
Mayo 11, 2006

Se presenta a consulta un perro de raza Viejo Pastor Inglés, macho de 9 meses de edad, con signos clínicos de vómito (después de comer y de color amarillento), diarrea líquida de color café oscuro (desde hace 3 días), anorexia y decaimiento marcado. Cuadro de vacunación incompleto (únicamente recibió una dosis de Parvovirus y una de vacuna Triple); no ha sido desparasitado cuando menos en los últimos seis meses.

## EXAMEN FÍSICO

Los hallazgos más relevantes fueron:

**Temperatura:** 40.1<sup>o</sup>C.

**Mucosas oral y ocular:**

- Hiperémicas y ligeramente secas.
- Dolor moderado en el abdomen medio.
- Lagañas amarillentas en ambos ojos.

**Lista de Problemas:**

- Temperatura elevada.
- Mucosas hiperémicas.
- Dolor en el abdomen.
- Secreciones oculares.
- Vómito.
- Diarrea.
- Anorexia y decaimiento.
- Vacunación incompleta.

**LISTA MAESTRA:**

**Fiebre:** Mucosas hiperémicas.

**Dolor abdominal:**

- Vómito, diarrea.
- Secreciones oculares.
- Vacunación incompleta.

**DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:**

- Coronavirus canino.
- Parvovirus canino.
- Moquillo canino.
- Salmonelosis.
- Campylobacteriosis.

## PRUEBAS DE LABORATORIO

**Historia clínica:** Síntomas del momento.

**Hemograma:**

- Leucopenia.
- Raspados conjuntivales.

**Coproparasitario:**

- Flotación.
- ELISA para la detección de IgM específica contra el virus de moquillo canino.

**Serología:**

- Títulos de IgM ( ) e IgG.
- La IgM puede ser detectada en perros infectados no vacunados, entre los 6 y 8 días post infección. La IgG aparece entre los 10 y 20 días.
- Líquido cefalorraquídeo

**DIAGNÓSTICO:** DISTEMPER.

## TRATAMIENTO

1. No existe ningún medicamento disponible para matar el virus en los perros infectados.
2. **Antibióticos de amplio espectro:** Para prevenir las infecciones secundarias.
3. **Administración de líquidos:** para el control del vómito, diarrea, síntomas neurológicos y la deshidratación.
4. Las secreciones nasales y oculares se limpian con algodones humedecidos sino que solamente se tratan los síntomas
5. Permanecer separados de otros perros.

## PRONÓSTICO

El pronóstico de la enfermedad es de reservado a grave.