

ACATAK®



Bioprotector
Inhibidor del crecimiento de garrapatas
Pour on



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Fluazurón..... 2.5 g
Excipientes c.s.p. 100 ml

DESCRIPCIÓN: ACATAK® POUR-ON está recomendado para el control estratégico de las garrapatas *Rhiphicephalus (Boophilus) microplus*, incluyendo cepas resistentes a los garrapaticidas conocidos. Mediante su uso de forma continua controla poblaciones de garrapatas en los potreros y en el ganado, llegando a ser necesario utilizar tan solo 3 a 4 aplicaciones/año, según el grado de incidencia y el tipo de explotación. ACATAK® POUR-ON interrumpe el ciclo de vida de las garrapatas en sus diferentes estadios al interferir en la formación de quitina, sustancia que conforma la cutícula; las larvas y ninfas hospedantes sobre la piel del ganado y que ingieren su sangre, no completarán la muda para los estadios siguientes y morirán. Las hembras adultas que, sobre el ganado tomen sangre, transferirán Fluazurón a sus ovarios y de ahí a sus huevos evitando que éstos eclosionen. De esta manera, con el uso de ACATAK® POUR-ON se aseguran potreros y animales más limpios.

INDICACIONES: En bovinos para el control de la garrapata *Rhiphicephalus (Boophilus) microplus*.

APLICACIÓN: ACATAK® POUR-ON se aplica sobre el lomo a la dosis de 1 ml por 10 kg de peso, es decir 2.5 mg de Fluazurón por kg de peso vivo del animal, es absorbido a través de la piel principalmente, y por vía oral cuando los animales se lamen, estableciéndose en el torrente sanguíneo un equilibrio de entrega mutua o doble vía entre éste y el tejido graso. Así se mantiene la concentración en la sangre por un tiempo prolongado (4 a 6 semanas). ACATAK® POUR-ON se aplica esparciendo el producto, listo para su uso, en dos franjas paralelas a lado y lado de la línea media dorsal desde la cruz hasta la base de la cola con el aplicador ACATAK® POUR-ON o con el envase dispensador de 1 litro.

TABLA DE DOSIFICACIÓN DE ACATAK®:

PESO (kg)	VOLUMEN (ml)	PESO (kg)	VOLUMEN (ml)
51 a 100	10	101 a 150	15
151 a 200	20	201 a 250	25
251 a 300	30	301 a 350	35
351 a 400	40	401 a 450	45
451 a 500	50	501 a 550	55
551 a 600	60	601 a 650	65

TIEMPO DE RETIRO: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 42 días después de finalizado el tratamiento. No administrar a bovinos en producción de leche para el consumo humano. No sacrificar terneros para consumo humano que estén siendo amamantados por vacas tratadas. No tratar vacas preñadas durante las 6 semanas previas al parto.

Disposición de desechos: Los empaques vacíos deben ser destruidos en un incinerador aprobado. El producto derramado no puede utilizarse y debe ser destruido.

Clasificación Toxicológica III (Medianamente Tóxico).

NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA

PARA CONSUMO.

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta el agua en la mezcla de aplicación. Luego destrúyalo.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

USO VETERINARIO.

PRESENTACIONES:

Garrafa x 1 litro.

Garrafa x 5 litro + Aplicador.

REGISTRO: 3B2-4857-AGROCALIDAD

ELABORADO POR: ELANCO