

## ADVANTIX®



Antiparasitario de uso externo  
Spot on



### COMPOSICIÓN:

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Imidacloprid .....      | 100 mg |
| Permetrina .....        | 500 mg |
| Excipientes c.s.p. .... | 1 ml   |

**INDICACIONES:** Para el control y tratamiento de infestaciones por garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*, *Dermacentor* spp.) y pulgas (*Ctenocephalides* spp.), actuando también como repelente de moscas y mosquitos (*Stomoxys calcitrans*, *Culex* spp., *Aedes* spp., *Anopheles* spp., *Lutzomia* spp., *Phelobotomus perniciosus*).

**CONTRAINDICACIONES:** No utilizar en perros menores de 7 semanas de edad.

### MODO DE APLICACIÓN:

Para uso externo únicamente.

1. Quitar la tapa.
2. Volver a colocar la tapa en sentido contrario.
3. Girar la tapa para perforar la pipeta y retirar la tapa de nuevo.



4. Separe el pelo de la parte posterior de la cabeza y aplique todo el contenido de la pipeta directamente sobre la piel del animal.



**DOSIS:** Para perros hasta 4 kg de peso: 1 pipeta de 0.4 ml equivalente a un mínimo de 10 mg/kg de peso corporal de Imidacloprid y 50 mg/kg de peso corporal de Permetrina.

**PRECAUCIONES:** No comer, beber y fumar durante la aplicación del producto. Lávese las manos después de utilizar el producto. Evite el contacto directo con el producto. En caso de contacto con la piel o mucosas lave la parte afectada con abundante agua durante 15 minutos y consulte un especialista.  
**NO USAR EN GATOS.**

**EFFECTOS INDESEADOS:** En raras ocasiones se pueden presentar reacciones en los perros como sensibilidad cutánea (incluyendo prurito y/o eritema en el sitio de aplicación) o letargia.

**CONDICIONES DE CONSERVACIÓN:** Conservar entre 15° y 30°C no congelar ni refrigerar.

**MANEJO DE CASOS DE INTOXICACIÓN:** En caso de intoxicación en humanos llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela una copia de la etiqueta. En caso

de intoxicación del animal llame al Médico Veterinario. No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático. En caso de emergencia por ingestión o contacto en humanos, derrame, incendio, explosión o accidente, favor llamar a Ciprosquim: Ecuador: 1-800-59-3005.

**RECOMENDACIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:** Deshacerse de los envases vacíos y sus residuos acorde a la normatividad ambiental vigente de gestión integral de residuos peligrosos.

**MATERIAL DE EMPAQUE:** Caja de cartón conteniendo un sachet con una pipeta.

**CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA:** MEDIANAMENTE TÓXICO (Categoría III) CUIDADO (Azul).

**VIDA ÚTIL:** 24 meses.

### PRESENTACIONES:

- Caja x 1 pipeta x 0.4 ml
- Caja x 1 pipeta x 1.0 ml
- Caja x 1 pipeta x 2.5 ml
- Caja x 1 pipeta x 4.0 ml

**REGISTRO:** 3B1-2-3-8865-AGROCALIDAD

**FABRICADO POR:** BAYER KVP PHARMA - ALEMANIA

**DISTRIBUIDO POR:** ELANCO