

AFIPRON POUR ON



Antiparasitario; interno y externo
Solución tópica pour on



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Fipronil.....	1,30 g
Abamectina.....	0,89 g
Vehículo c.s.p.....	100 ml

INDICACIONES: Es una solución tópica para el control y tratamiento de parásitos externos e internos en bovinos, ovinos y caprinos es un parasiticida de amplio espectro eficaz contra nematodos gastrointestinales, nematodos pulmonares, larvas de moscas, ácaros de la sarna, piojos, moscas y garrapatas. Previene posteriores infestaciones debido a su efecto adulticida y larvicida sobre los parásitos.

ENDOPARÁSITOS:

Nematodos gastrointestinales: *Ostertagia* spp.; *Haemonchus placei*; *Trichostrongylus* spp.; *Oesophagostomum radiatum*, *Oesophagostomum* spp.; *Nematodirus* spp.; *Strongyloides papillosus*; *Trichuris* spp., *Cooperia* sp., *C. oncophora*, *C. punctata*.

Nematodos pulmonares: *Dictyocaulus* spp.

ECTOPARÁSITOS:

Garrapatas: *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*. Mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*), Mosca de la bichera (*Cochliomya hominivorax*). Piojos chupadores (*Linognathus vituli* y *Haematopinus eurystemus*); masticadores (*Damalinea bovis* y *Solenopotes capillatus*). Ácaros de la sarna: *Chorioptes bovis*; *Sarcoptes scabiei*, var. *bovis*.

DOSIS:

Bovinos, Ovinos y Caprinos: La dosis recomendada es de 1 ml por cada 10 kg de peso vivo. El intervalo de tratamiento debe ser de al menos 2 meses pero depende de la severidad de la infestación, condiciones ambientales y condiciones del establo.

PESO CORPORAL (kg)	DOSIS/ml
0-100	10
150	15
200	20
250	25
300	30
350	35
400	40
450	45
500	50

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica.

PREPARACIÓN: Ninguna. Producto listo para su aplicación.

CONTRAINDICACIONES: No se debe utilizar en animales con hipersensibilidad o alergia sabida a la droga, el intervalo entre tratamientos no debe ser menor a los 2 meses. No administrar a vacas en periodo de lactancia ni tampoco dentro de los 28 días antes del parto.

ADVERTENCIAS: Es aconsejable no aplicar en animales mojados: Si ocurrieran precipitaciones dentro de las 2 horas luego de la aplicación, la eficacia del producto puede disminuir. Por ser un agente tópico, la irritación temporal en el sitio del uso es posible. Use guantes, especialmente cuando tratará a un grupo de animales.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: No se debe usar en vacas que estén dentro los 28 días antes del parto ni administrar en periodo de lactancia.

REACCIONES ADVERSAS: Si se aplica la dosis recomendada y en las especies autorizadas no debería presentarse reacciones adversas.

Si se aplicase por error en caninos y sobre todo en razas que son susceptibles como el Collie, Pastor shetland, Pastor australiano, Antiguo pastor inglés, Pastor Alemán, Skye Terrier, Doberman y en el gato, se pueden presentar luego de la administración somnolencia, midriasis, comportamiento anormal, temblores, salivación, letargia, vómito, convulsiones, hipertermia e incluso la muerte, que ocurre por hipoxia y bradicardia.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: Ninguno reportado.

TIEMPO DE RETIRO: 100 días. No administrar a bovinos cuya leche se destine al consumo humano.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Frasco Pead x 100 ml
Frasco Pead x 250 ml
Frasco Pead x 500 ml
Frasco Pead x 1 000 ml
Frasco vidrio ámbar x 100 ml

REGISTRO: 3B1-2-3-10867-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha
Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag
Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246
www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador