

## ALLMECTIN AD<sub>3</sub>E



**Antiparasitario; interno y externo**  
Solución inyectable



**COMPOSICIÓN:** Cada 100 ml contiene:

Ivermectina.....	1,2 g
Vitamina A propionato.....	250.000 UI
Vitamina D <sub>3</sub> .....	37.250 UI
Vitamina E acetato.....	2.500 UI
Vehículo c.s.p.....	100 ml

**INDICACIONES:** Está indicado para el tratamiento y control de parasitosis interna y externa.

Controla nematodos gastrointestinales, pulmonares, piojos chupadores, miasis cutáneas y sarna común de bovino.

Las vitaminas AD<sub>3</sub>E coadyuvan a la pronta recuperación y restablecimiento del animal.

**Bovinos, ovinos y caprinos:**

**Parásitos gastrointestinales:** *Haemonchus* sp., *Ostertagia ostertagi*, *Ostertagia lyrata*, *Trichostrongylus* sp., *Cooperia oncophora*, *Cooperia punctata*, *Cooperia pectinata*, *Oesophagostomum radiatum*, *Strongyloides papillosus*, *Nematodirus helvetianus*, *Nematodirus spathiger*, *Toxocara vitulorum* y *Trichuris* spp.

**Parásitos pulmonares:** *Dictiocaulus viviparus*, *Dictiocaulus filaria*.

**Ectoparásitos:** *Sarcoptes* sp., *Haematopinus* spp., *Dermatobia hominis*, *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*, *Cochliomya hominivorax*, *Linognathus vituli*, *Psoroptes* spp. También está indicado como auxiliar en el control de la población de la mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*) y como preventivo de miasis en el ombligo de terneros recién nacidos y en las heridas de castración.

**PORCINOS:**

**Parásitos gastrointestinales:** *Ascaris suum*, *Hyostrongylus rubidus*, *Oesophagostomum* spp., *Strongyloides ransomi*.

**Parásitos pulmonares:** *Metastrongylus* spp.

**Parásitos renales:** *Stephanurus dentatus*.

**DOSIS:**

**Bovinos:** 1 ml/50 kg de peso vivo.

PESO kg	DOSIS ml
Hasta 50	1
51 - 100	2
101 - 150	3
151 - 200	4
201 - 250	5
251 - 300	6
301 - 350	7
351 - 400	8

**Ovinos y Caprinos:** 0.5 ml/25 kg de peso vivo.

PESO kg	DOSIS ml
Hasta 25	0.5
26 - 50	1.0
51 - 75	1.5
76 - 100	2.0

**Porcinos:** 1 ml/ 33 kg de peso vivo.

PESO kg	DOSIS ml
8	0.25

16	0.50
33	1.00
66	2.00
100	3.00
133	4.00
166	5.00
200	6.00

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Subcutánea.

El intervalo entre dosis depende del grado de infestación, generalmente se utiliza entre 90 a 120 días.

**CONTRAINDICACIONES:** Sólo administrar en ganado de carne. Dosificar de acuerdo a las instrucciones para evitar concentraciones subterapéuticas.

**ADVERTENCIAS:** No se debe utilizar en vacas que estén en período de producción o lactancia o cercanas al parto, dada la sensibilidad de los neonatos a la ivermectina. No se recomienda en otra especie que no sea la autorizada.

**USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA:** No se debe usar en vacas que estén en período de producción o lactancia o cercanas al parto.

**REACCIONES ADVERSAS:** Si se aplicase por error en caninos y sobre todo en razas que son susceptibles como el Collie, Pastor shetland, Pastor australiano, Antiguo pastor inglés, Pastor Alemán, Skye Terrier, Doberman y en el gato, se pueden presentar luego de la administración somnolencia, midriasis, comportamiento anormal, temblores, salivación, letargia, vómito, convulsiones, hipertermia e incluso la muerte, que ocurre por hipoxia y bradicardia.

**RETIRO:** Bovinos: 120 días; Ovinos, Porcinos y Caprinos: 35 días.

**ALMACENAMIENTO:** Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

**PRESENTACIONES:**

Frascos x 10 ml.  
Frascos x 50 ml.  
Frascos x 100 ml.  
Frascos x 250 ml.  
Frascos x 500 ml.

**REGISTRO:** 3A1-B1-10959-AGROCALIDAD

**ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR:** FARBIOPHARMA S.A.

**Dirección:** Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha  
Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador