

ALLMECTIN GOLD



Antiparasitario interno y externo
Solución inyectable



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Ivermectina 4 g
Vehículo c.s.p 100 ml

INDICACIONES: Está indicado para el tratamiento y control de parasitosis interna y externa.

Controla nematodos gastrointestinales, pulmonares, piojos chupadores, miasis cutáneas y sarna común de bovino.

Bovinos, ovinos y caprinos:

Parásitos gastrointestinales: *Haemonchus* sp., *Ostertagia ostertagi*, *Ostertagia lyrata*, *Trichostrongylus* sp., *Cooperia oncophora*, *Cooperia punctata*, *Cooperia pectinata*, *Oesophagostomum radiatum*, *Strongyloides papillosus*, *Nematodirus helvetianus*, *Nematodirus spathiger*, *Toxocara vitulorum* y *Trichuris* spp.

Parásitos pulmonares: *Dictiocaulus viviparus*, *Dictiocaulus filaria*.

Ectoparásitos: *Sarcoptes* sp., *Haematopinus* sp., *Dermatobia hominis*, *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*, *Cochliomya hominivorax*, *Linognathus vituli*, *Psoroptes* spp. También está indicado como auxiliar en el control de la población de la mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*) y como preventivo de miasis en el ombligo de terneros recién nacidos y en las heridas de castración.

Porcinos:

Parásitos gastrointestinales: *Ascaris suum*, *Hyostrongylus rubidus*, *Oesophagostomum* spp., *Strongyloides ransomi*.

Parásitos pulmonares: *Metastrongylus* spp.

Parásitos renales: *Stephanurus dentatus*.

DOSIS:

Bovinos: 1 ml/50 kg de peso vivo.

Ovinos y Caprinos: 0.5 ml /25 kg de peso vivo.

Porcinos: 1 ml/ 33 kg de peso vivo.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea.

PREPARACIÓN: Ninguna. Producto listo para su aplicación.

CONTRAINDICACIONES: Sólo administrar en ganado de carne.

Dosificar de acuerdo a las instrucciones para evitar concentraciones subterapéuticas.

ADVERTENCIAS: No se debe utilizar en vacas que estén en período de producción o lactancia o cercanas al parto, dada la sensibilidad de los neonatos a la ivermectina. No se recomienda en otra especie que no sea la autorizada.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA:

No se debe usar en vacas que estén en período de producción o lactancia o cercanas al parto.

REACCIONES ADVERSAS: Si se aplicase por error en caninos y sobre todo en razas que son susceptibles como el Collie, Pastor shetland, Pastor australiano, Antiguo pastor inglés, Pastor Alemán, Skye Terrier, Doberman y en el gato, se pueden presentar luego de la administración somnolencia, midriasis, comportamiento anormal, temblores, salivación, letargia, vómito, convulsiones, hipertermia e incluso la muerte, que ocurre por hipoxia y bradicardia.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: Se combina con febantel, fenbendazol, praziquantel, pirantel, albendazol entre otros para aumentar su espectro.

TIEMPO DE RETIRO: Carne 120 días antes del sacrificio.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Frasco x 10 ml.

Frasco x 20 ml.

Frasco x 100 ml.

Frasco x 250 ml.

Frasco x 500 ml.

REGISTRO: 3A-3B-11169-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador