

ALLMECTIN POUR ON



Antiparasitario externo
Pour on



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Ivermectina.....	1 g
Vehículo c.s.p.....	100 ml

INDICACIONES: Antiparasitario externo para el control y tratamiento de sarna, pulgas, garrapatas y piojos en animales domésticos.

En aves: *Menacanthus stramineus*, *Menopon gallinae*, *Cuclogaster heterographa*, *Lipeurus caponis*.

En pavos: *Oxylpeurus polytrapezius*.

En cuyes: *Gyropus ovalis*, *Gliricola porcelli*.

En conejos: *Haemodipsus ventricosus*.

DOSIS: 5 gotas por kg de peso.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica- Pour on. Aplicar en la línea dorsal del animal desde el cuello hasta la cola. En el caso de aves, aplicar en la parte baja de la cloaca o en las alas, por la mayor incidencia de estos parásitos.

PREPARACIÓN: Ninguna. Producto listo para su aplicación.

CONTRAINDICACIONES: No se debe utilizar en animales que estén lactando ni 28 días antes del parto, dada la sensibilidad de los neonatos a las Ivermectinas. No usar en otras especies que no sean las autorizadas.

ADVERTENCIAS: El fármaco se puede considerar para la mayoría de las especies seguro. Los seres vivos cuyo hábitat es el medio acuático, son especialmente sensibles a la acción de la ivermectina, por lo tanto no arroje los envases vacíos en ríos, estanques, bordos u otros cuerpos de agua ya que las Ivermectinas pueden alterar el ecosistema.

No mojar a los animales hasta después de transcurrido un lapso de 6 horas después del tratamiento. Use guantes, especialmente cuando tratará a un grupo de animales.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: No aplicar en animales que estén lactando ni 28 días antes del parto, dada la sensibilidad de los neonatos a la ivermectina.

REACCIONES ADVERSAS: No se han reportado en las especies a las cuales está destinada el producto sin embargo, si se aplicase por error en caninos y sobre todo en razas que son susceptibles como el Collie, Pastor shetland, Pastor australiano, Antiguo pastor inglés, Pastor Alemán, Skye Terrier, Doberman y en el gato, se pueden presentar luego de la administración somnolencia, midriasis, comportamiento anormal, temblores, salivación, letargia, vómito, convulsiones, hipertermia e incluso la muerte, que ocurre por hipoxia y bradicardia.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: Se combina con febantel, fenbendazol, prazicuantel, pirantel, albendazol entre otros para aumentar su espectro.

TIEMPO DE RETIRO: Carne y Huevos 48 días.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Gotero x 10 ml
Gotero x 60 ml
Frasco x 500 ml

REGISTRO: 3B-11151-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador