

## ALLMECTIN



**Antiparasitario interno y externo**  
Solución inyectable



**COMPOSICIÓN:** Cada 100 ml contiene:

Ivermectina.....	1 g
Vehículo c.s.p.....	100 ml

**INDICACIONES:** Antiparasitario interno y externo para el control de endoparásitos gastrointestinales y pulmonares redondos y ectoparásitos: Nuca, piojos y ácaros de la sarna, garrapatas, en bovinos, ovinos y porcinos.

**Nematodos gastrointestinales:** *Ostertagia ostertagi*, *Ostertagia lyrata*, *Bunostomum phlebotomum*, *Haemonchus placei*, *Haemonchus contortus*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia* spp.; *Strongyloides papillosus*, *Nematodirus* spp.; *Oesophagostomum radiatum*, *Oesophagostomum venulosum*, *Trichuris* sp; *Ascaris suum*, *Hyostrongylus rubidus*, *Strongyloides ransomi*, *Toxocara* sp; *Parafilaria bovicola*, *Mecistocirrus digitatus*, entre otros.

**Nematodos pulmonares:** *Dictyocaulus viviparus*, *Metastrongylus* sp entre otros.

**Larvas de moscas:** *Hypoderma bovis*, *Hypoderma lineatum*, *Dermatobia hominis*, *Paraphilaria bovicola*, *Thelazia* sp.; entre otras.

**Piojos:** *Damalinea bovis*, *Hematopinus suis*, *Linognathus vitulli*, *Haematopinus eurytenuis*, *Solenopotes capillatus* entre otros.

**Ácaros de la sarna:** *Chorioptes bovis*, *Sarcoptes scabiei*, *Psoroptes communis*, entre otros.

**Moscas:** *Haematobia irritans* entre otras.

**Garrapatas:** *Rhipicephalus microplus*, *Hypoderma bovis*, *Amblyoma* sp., entre otras

**DOSIS:** 1 ml por cada 50 kg de peso vivo.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Subcutánea.

**PREPARACIÓN:** Ninguna. Producto listo para su aplicación.

**CONTRAINDICACIONES:** No aplicar en vacas que estén en período de producción o lactancia o cercanas al parto. No usar en especies que no esté aprobada su uso.

**ADVERTENCIAS:** El fármaco se puede considerar para la mayoría de las especies seguro. Los seres vivos cuyo hábitat es el medio acuático, son especialmente sensibles a la acción de la ivermectina, por lo tanto no arroje los envases vacíos en ríos, estanques, bordos u otros cuerpos de agua ya que las Ivermectinas pueden alterar el ecosistema.

**USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA:** No aplicar en vacas que estén criando o cercanas al parto.

**REACCIONES ADVERSAS:** No se han reportado en las especies a las cuales está destinada el producto sin embargo, si se aplicase por error en caninos y sobre todo en razas que son susceptibles como el Collie, Pastor shetland, Pastor australiano, Antiguo pastor inglés, Pastor Alemán, Skye Terrier, Doberman y en el gato, se pueden presentar luego de la administración somnolencia, midriasis, comportamiento anormal, temblores, salivación, letargia, vómito, convulsiones, hipertermia e incluso la muerte, que ocurre por hipoxia y bradicardia.

**INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN:** Se combina con febantel, fenbendazol, praziquantel, pirantel, albendazol entre otros para aumentar su espectro.

**TIEMPO DE RETIRO:** Carne 21 días antes del sacrificio.

**CONTRAINDICACIÓN:** No usar en ganado lechero en lactación ni 30 días antes del parto.

**ALMACENAMIENTO:** Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

**DECLARACIÓN DE VENTA:** Con prescripción Médico Veterinaria.

**PRESENTACIONES:**

- Jeringa x 1 ml.
- Frasco x 3 ml
- Frasco x 10 ml.
- Frasco x 50 ml.
- Frasco x 100 ml.
- Frasco x 250 ml.
- Frasco x 500 ml.

**REGISTRO:** 3 A1-B1-7898-AGROCALIDAD

**ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR:** FARBIOPHARMA S.A.

**Dirección:** Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha  
Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag  
Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021  
SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246  
[www.farbiopharma.com/](http://www.farbiopharma.com/) Quito-Ecuador