

AMECTIN FORTE



Antiparasitario interno y externo
Solución inyectable



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Ivermectina.....	1,20 g
Buclicina HCl.....	0,09 g
Vitamina B ₁	0,036 g
Vitamina B ₂	0,01 g
Vitamina B ₁₂	0,00017 g
Vitamina C.....	0,0594 g
Niacinamida.....	0,2159 g
Vehículo c.s.p.....	100 ml

INDICACIONES: Para el tratamiento y control de parasitosis internas y externas del ganado. Controla nematodos gastrointestinales (incluyendo estados inhibidos de *Ostertagia*, pulmonares, piojos chupadores, miasis cutánea y sarna común de bovinos). Su componente Buclicina actúa como potente estimulante no hormonal del apetito y crecimiento.

NEMATODOS GASTROINTESTINALES:

Bovinos y ovinos:

Parásitos gastrointestinales: *Haemonchus* sp., *Ostertagia ostertagi*, *Ostertagia lyrata*, *Trichostrongylus* sp., *Cooperia oncophora*, *Cooperia punctata*, *Cooperia pectinata*, *Oesophagostomum radiatum*, *Strongyloides papillosus*, *Nematodirus helvetianus*, *Nematodirus spathiger*, *Toxocara vitulorum* y *Trichuris* spp.

Parásitos pulmonares: *Dictiocaulus viviparus*, *Dictiocaulus filaria*.

Ectoparásitos: *Sarcoptes* sp., *Haematopinus* sp., *Dermatobia hominis*, *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*, *Cochliomya hominivorax*, *Linognathus vituli*, *Psoroptes* spp. También está indicado como auxiliar en el control de la población de la mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*) y como preventivo de miasis en el ombligo de terneros recién nacidos y en las heridas de castración.

Porcinos:

Parásitos gastrointestinales: *Ascaris suum*, *Hyostrongylus rubidus*, *Oesophagostomum* spp., *Strongyloides ransomi*.

Parásitos pulmonares: *Metastrongylus* spp.

Parásitos renales: *Stephanurus dentatus*.

Caninos: *Dirophilaria immitis*.

DOSIS: 1 ml por cada 60 kg en bovinos, ovinos y caninos.
1 ml por cada 33 kg en porcinos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea.

PREPARACIÓN: Ninguna. Producto listo para su aplicación.

CONTRAINDICACIONES: No usar en ganado lechero en lactancia ni 28 días antes del parto. Contraindicada en ciertas razas caninas: Collie, Shetland, Bobtail y sus cruces.

ADVERTENCIAS: El fármaco se puede considerar para la mayoría de las especies seguro. Los seres vivos cuyo hábitat es el medio acuático, son especialmente sensibles a la acción de la ivermectina, por lo tanto no arroje los envases vacíos en ríos, estanques, bordos u otros cuerpos de agua ya que las Ivermectinas pueden alterar el ecosistema.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA:

No aplicar en vacas que estén en periodo de producción o lactancia o cercanas al parto

REACCIONES ADVERSAS: Si se aplicase por error en caninos y

sobre todo en razas que son susceptibles como el Collie, Pastor shetland, Pastor australiano, Antiguo pastor inglés, Pastor Alemán, Skye Terrier, Doberman y en el gato, se pueden presentar luego de la administración somnolencia, midriasis, comportamiento anormal, temblores, salivación, letargia, vómito, convulsiones, hipertermia e incluso la muerte, que ocurre por hipoxia y bradicardia.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: Se combina con febantel, fenbendazol, praziquantel, pirantel, albendazol entre otros para aumentar su espectro.

TIEMPO DE RETIRO: Antes del sacrificio en: Bovinos, ovinos: 35 días y cerdos: 18 días.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Frasco x 10 ml
Frasco x 50 ml
Frasco x 100 ml
Frasco x 250 ml
Frasco x 500 ml

REGISTRO: 3 A-3B-12275-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador