AMINOJET

FARBIO PHARMA

Suplemento de vitaminas, minerales y aminoácidos
Solución inyectable

COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Cloruro de Calcio	0,015 g
Acetato de Sodio	0,025 g
Cloruro de Potasio	0,020 g
Sulfato de Magnesio	0,022 g
Vitamina B_1 (Tiamina)	0,011 g
Vitamina B_2 (Riboflavina)	0,004 g
Vitamina B_3 (Niacinamida)	0,060 g
Vitamina B_6 (Piridoxina)	0,020 g
Vitamina B_{12} (Cianocobalamina)	0,010 mg
L-Leucina	0,136 g
Hidrocloruro de L-Lisina	0,170 g
L-Ácido Glutámico	0,005 g
L-Valina	0,140 g
L-Fenilalanina	0,102 g
Hidrocloruro de L-Arginina	0,085 g
L-Isoleucina	0,085 g
L-Treonina	0,080 g
Hidrocloruro de L-Histidina	0,060 g
L-Metionina	0,060g
L-Triptófano	0,060 g
Hidrocloruro de L-Cisteina	0,050 g
Dextrosa	5.000 g
Vehículo c.s.p	100 ml

INDICACIONES: Las Vitaminas, Aminoácidos y Minerales que se encuentran en el producto, están indicados en estados carenciales, como restaurador general del equilibrio vitamínico para las funciones correctas del organismo; optimizando las condiciones en la reproducción, fertilidad, alimentación y crecimiento, mejorando las condiciones de salud y rendimiento en los animales.

DOSIS: 1 ml por cada kg de peso vivo.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea o Intravenosa lenta. En equinos específicamente se debe usar vía intravenosa.

PREPARACIÓN: Ninguna. Producto listo para su aplicación.

CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes.
Está contraindicado en animales con hipervitaminosis.
No se produce ningún efecto adverso atribuible al producto, sin embargo en raras ocasiones puede provocar sensibilidad a uno de los componentes, en este caso administrar algún antihistamínico, en cuanto a antagonismos farmacológicos no posee ninguno e incompatibilidades tampoco.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA:
No se han reportado para vitaminas.

ADVERTENCIAS:
Use guantes, especialmente cuando tratará a un grupo de animales.
No se recomienda en otra especie que no sea la autorizada.

REACCIONES ADVERSAS: Si se aplica la dosis recomendada y en las especies autorizadas no debería presentarse reacciones adversas.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: Ninguno reportado.

TIEMPO DE RETIRO: No aplica en vitaminas, minerales y aminoácidos.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15ºC y 30ºC. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:
Frasco x 100 ml
Frasco x 500 ml

REGISTRO: 10ABC – 13965- AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.
Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha
Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag
Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021
SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246
www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador