

AMIRVOSS 20.8%



Antiparasitario externo
Solución



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Amitraz	20,8 g
Vehículo c.s.p	100 ml

INDICACIONES: **AMIRVOSS 20.8%**, elimina todo tipo de ectoparásitos: Parásitos externos: Larvas de *Dermatobia hominis*, *Hypoderma Bovis* y *H. Lineatum*. Ácaros: *Chorioptes bovis* (ayuda en el control de estos parásitos). *Sarcoptes scabiei var bovis*. Garrapatas: *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* bovinos. (*Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes scapularis* y *ricinus* & *Dermacentor variabilis*). Mosca: (*Cochliomya hominivorax*) ayuda en el control de la miasis cutáneas (gusanera) causada por la larva de la mosca. Se puede aplicar en instalaciones avícolas, porcinas y establos.

DOSIS:

En Bovinos a una concentración de 200 ppm la dosis es 20 ml de **AMIRVOSS 20.8%** en 20 litros de agua.
 En Ovinos a una concentración de 400 ppm la dosis es 40 ml de **AMIRVOSS 20.8%** en 20 litros de agua.
 En Porcinos a una concentración de 500 ppm la dosis es 50 ml de **AMIRVOSS 20.8%** en 20 litros de agua.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica.

PREPARACIÓN: Con agua fría o tibia.

CONTRAINDICACIONES: Moderadamente peligroso. Uso externo únicamente. Evitar contaminar cursos de agua como ríos, arroyos, etc. No utilizar en equinos, hembras gestantes, no mezclar junto con alimentos, este producto no está aprobado para ser usado en caninos y felinos.

ADVERTENCIAS: No usar en baños de inmersión. No bañar animales cansados, sedientos en intenso calor o animales geriátricos. No usar en equinos y animales menores a 4 meses de edad. El intervalo entre tratamiento no debe ser menor a los 2 meses. No administrar a vacas en periodo de lactancia ni tampoco dentro de los 28 días antes del parto. En algunos casos pueden presentarse ataxia, depresión, sedación a dosis elevadas.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: No usar en hembras gestantes.

REACCIONES ADVERSAS: Su margen de seguridad es amplio, no obstante su uso está contraindicado en equinos, ya que es un depresor de los movimientos intestinales en esta especie, favoreciendo la aparición de cólico.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: En caso de intoxicación, no administrar atropina, ya que las oximas potencian la intoxicación con amitraz porque no interactúan con la colinesterasa carbamilatada pero inhiben a la colinesterasa.

TIEMPO DE RETIRO: Carne 14 días. Leche 24 horas.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Venta Bajo Receta Médica.

PRESENTACIONES:

Frasco x 20 ml
Frasco x 100 ml

Frasco x 250 ml
Frasco x 500 ml
Frasco x 1 000 ml

REGISTRO: 3B2-13566-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador