

AMIRVOSS



Antiparasitario externo
Solución tópica



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Amitraz 12,5 g
Fipronil 1,0 g
Vehículo c.s.p 100 ml

INDICACIONES: AMIRVOSS elimina todo tipo de ectoparásitos: Parásitos externos: Larvas de *Dermatobia hominis*, *Hypoderma bovis* y *H. lineatum*.

ÁCAROS: *Chorioptes bovis* (ayuda en el control de estos parásitos). *Sarcoptes scabiei var bovis*. Garrapatas *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* bovinos. (*Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes scapularis* y *ricinus* & *Dermacentor variabilis*). Mosca: (*Cochliomyia hominivorax*) ayuda en el control de la miasis cutánea (gusanera) causada por la larva de la mosca. Se puede aplicar en instalaciones avícolas, porcinas y establos.

DOSIS DE AMIRVOSS:

ESPECIE	MÉTODO	CONCENTRACIÓN	DILUCIÓN
BOVINOS	Baño	200 ppm	20 ml en 12.5 l agua
	Pulverización	250 ppm	20 ml en 10 l agua
OVINOS	Baño	300 ppm	20 ml en 6.25 l agua
PORCINOS	Pulverización	500 ppm	20 ml en 2.5 l agua
CANINOS	Pulverización	250 ppm	2 ml en 1 l agua

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica.

PREPARACIÓN: Con agua fría o tibia.

CONTRAINDICACIONES: Moderadamente peligroso. Uso externo únicamente. Evitar contaminar cursos de agua como ríos, arroyos, etc. No utilizar en equinos, hembras gestantes, no mezclar junto con alimentos.

ADVERTENCIAS: No bañar animales cansados, sedentos en intenso calor o animales geriátricos. No usar en equinos y animales menores a 4 meses de edad. El intervalo entre tratamiento no debe ser menor a los 2 meses. No administrar a vacas en periodo de lactancia ni tampoco dentro de los 28 días antes del parto. En algunos casos pueden presentarse ataxia, depresión, sedación a dosis elevadas.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: No usar en hembras gestantes ni en etapa de lactación.

REACCIONES ADVERSAS: Su margen de seguridad es amplio, no obstante su uso está contraindicado en equinos, por poseer amitraz el producto, ya que es un depresor de los movimientos intestinales en esta especie, favoreciendo la aparición de cólico. El amitraz usado en caninos de raza Collie y terneros, si se emplea el baño por inmersión, se ha observado depresión general, ataxia, hipotermia, vómito, diarrea, signos graves de depresión, hiperglucemia, poliuria y bradicardia.

El Fipronil puede causar reacciones locales como inflamación cutánea, eritema, intenso prurito y caída del pelo y sistémico como

gastroenteritis, vómitos.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: En caso de intoxicación, no administrar atropina, ya que las oximas potencian la intoxicación con amitraz porque no interactúan con la colinesterasa carbamilatada pero inhiben a la colinesterasa.

TIEMPO DE RETIRO: Carne 14 días. Leche 24 horas.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Venta Bajo Receta Médica.

PRESENTACIONES:

Frasco x 20 ml

REGISTRO: 3B-11170-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com Quito-Ecuador