

AMITRAZ 12.5%



Antiparasitario externo
Emulsión líquida



FÓRMULA: Cada 100 ml contiene:

Amitraz 12.5 g
Vehículo c.s.p. 100 ml

ESPECIES: Bovinos, caprinos, ovinos, porcinos y caninos.

DOSIS DE AMITRAZ 12.5%:

BOVINOS: (Garrapata) 1.6 ml/1 l de gua.

OVINOS Y CAPRINOS: (Sarna y piojo) 3.2 ml/ 1 l de agua.

PORCINOS: (Sarna) 20 ml/5 litros de agua.

CANINOS: (Garrapata) 2 ml/1 litro de agua, (Sarna demodécica o sarcóptica) 4 ml/1 litro de agua.

INDICACIONES DE USO: Ectoparasitocida de uso en caninos, bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. Su espectro de acción incluye: ácaros y garrapatas (*Boophilus microplus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Psoroptes* spp., *Sarcoptes scabiei*, *Notoedres cati*, *Demodex canis*), piojos y melófagos (*Linognathus ovillus*, *Linognathus pedalis*, *Bovicola ovis*, *Melophagus ovinus*).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica por baño de aspersión o manga rociadora.

FARMACOCINÉTICA: La absorción de amitraz administrado vía cutánea es bajísima. El amitraz se degrada en el pelaje a N-metil-(2,4-xilil) formamidina. Pequeñas concentraciones del producto de degradación dimetilnilina también pueden ser detectadas en la piel del animal tratado.

MECANISMO DE ACCIÓN: En los caninos, el amitraz en solución es usado principalmente por vía tópica para el tratamiento de la demodicosis generalizada y para el tratamiento y la prevención de infestación por pulgas y garrapatas.

La acción farmacológica del amitraz no está bien comprendida, pero es un inhibidor de la monoamino oxidasa (en los ácaros) y puede tener efectos adversos sobre el SNC de los organismos susceptibles. Al parecer, también posee actividad alfa-2-adrenérgica e inhibe la síntesis de prostaglandinas.

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES:

- No se ha demostrado la seguridad de su uso en caninos menores a 4 meses de edad.
- Las razas caninas toy pueden ser más susceptibles a los efectos neurológicos centrales (sedación transitoria); por lo cual se recomienda el uso de dosis bajas (la mitad de la recomendada). No utilizar en caninos de raza Chihuahua.
- Debido a los efectos de la droga sobre la glucemia, utilizar con cuidado en los pacientes diabéticos no controlados. No se ha establecido la seguridad en hembras gestantes. Usarlo sólo cuando los beneficios superan a los posibles riesgos del tratamiento.
- No utilizar sobre pacientes con presencia de piodermas profundas con formación de fístulas; posponer la aplicación hasta que las lesiones mejoren, después de haber realizado un tratamiento con antibióticos y champú.
- No se recomienda su uso en otra especie que no sea la autorizada.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: Evitar la administración concurrente con otros ectoparasitocidas de uso tópico.

REACCIONES ADVERSAS:

- Los efectos adversos son más probables en los pacientes debilitados o gerontes, o en las razas caninas de talla muy pequeña.
- Los efectos adversos podrían incluir: ataxia, bradicardia, vómi-

tos, diarrea, hipotermia e hiperglucemia transitoria. Rara vez se han registrado convulsiones.

- Los efectos adversos tópicos pueden incluir edema, eritema y prurito.
- El amitraz puede ser tóxico si es ingerido (tanto por los animales como por el hombre). La yohimbina a una dosis de 0.11 – 0.2 mg/kg IV (comenzando por el rango de dosis más bajo) puede ser beneficiosa para los efectos de una sobredosis, en animales.

RETIRO:

En animales de carne para consumo humano: 14 días.

En animales productores de leche: 24 horas.

PRESENTACIONES:

Frasco x 33 ml
Frasco x 200 ml
Frasco x 1 000 ml

REGISTRO: 3B1-11874-AGROCALIDAD

ELABORADO POR: FARBIOPHARMA S.A. para INPEL QUALITY

Elaborado por: FARBIOPHARMA S.A. para INPEL QUALITY

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Píntag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador