

AMITRAZ



Antiparasitario, Garrapaticida uso externo
Solución



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Amitraz 21 g
Excipientes c.s.p..... 100 ml

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Antiparasitario, Garrapaticida uso externo.

FORMA FARMACÉUTICA: Solución.

INDICACIONES DE USO: AMITRAZ es una amidina, que actúa contra garrapatas resistentes a organofosforados y piretroides. Eficaz para el control de los géneros de *Boophilus microplus* y *Amblyoma cajennense* en bovinos.

AMITRAZ es un poderoso Garrapaticida de efecto rápido y elevada persistencia cuyo principio activo es el Amitraz. Actúa introduciéndose por contacto o ingestión sobre el sistema nervioso del parásito, presentando gran velocidad de penetración. **AMITRAZ** es fotoestable, termoestable, de baja toxicidad para mamíferos.

En ovinos, controla ectoparásitos como: Psoroptes, Melophagus, Damalinia y Linognathus.

DOSIS SUGERIDA:

Aspersión: 1ml de **AMITRAZ** por cada litro de agua, usar una bomba de fumigar u otro equipo de aspersión.

Para otras diluciones se puede emplear la siguiente tabla.

ESPECIE		AMITRAZ
BOVINOS baño	Carga	0,95 ml / litro de agua
	Refuerzo	1,90 ml / litro de agua
BOVINOS	Pulverización	1,19 ml / litro de agua
OVINOS Baño	Carga	1,90 ml / litro de agua
	Refuerzo	3,80 ml / litro de agua
PORCINOS	Pulverización	2,38 ml / litro de agua
CANINOS	Garrapata	1,19 ml / litro de agua
	Sarna (Demodex o Sarcoptes)	2,38 ml / litro de agua

La dosis podrá ser modificada a indicación expresa del Médico Veterinario.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Rociar los animales utilizando aproximadamente 4 a 5 litros de emulsión por cada animal adulto. Para mayor fijación del producto dirija la aspersión en sentido contrario al pelo.

USO VETERINARIO.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Mantener el envase bien cerrado.
- Conservar en un lugar fresco y seco, entre 4°C y 32°C y 70% de HR.
- Proteger de la luz solar.

ADVERTENCIAS:

- No verter el producto en afluentes como ríos o arroyos.
- No reutilizar este envase.
- Descartar los restos de la mezcla si no fue utilizada. No ingerir alimentos, ni fumar durante la aplicación. Antes de manipular y aplicar, usar equipo personal de seguridad: overol, botas, mascarilla, gorra, anteojos y guantes de caucho que impidan el contacto directo con la piel. Reemplace los implementos defectuosos. No exponerse ni respirar vapores de la aspersión. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Al terminar la aplicación,

cámbiense de ropa y báñese.

- Venta libre.

MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

TIEMPO DE RETIRO:

Leche: 48 horas.

Carne: 7 días.

PRESENTACIONES:

Frasco x 20 ml. Caja x 12 unidades

Frasco x 100 ml

Frasco x 1 litro

Q.F.R.: Nelly López de Cobo

REGISTRO: 3B2-12207-AGROCALIDAD

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: C.C. Laboratorios Pharmavital Cia Ltda, km. 7 ½ vía Quito, Ambato – Ecuador

Servicio al cliente: (593) 2 2806167 - (593) 2 2806436