

AMOXCLAUS



Antibiótico
Polvo para suspensión oral



COMPOSICIÓN: Cada 100 g de polvo contiene:

Amoxicilina trihidratada	24 g
Excipiente c.s.p	100 g
Cada 60 ml reconstituido contiene:	
Amoxicilina trihidratada	4.200 mg
Vehículo c.s.p	60 ml
Cada 5 ml reconstituido contiene:	
Amoxicilina trihidratada	350 mg

INDICACIONES: Antibiótico de amplio espectro contra: *Pasteurella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Corynebacterium*, entre otros.

Presenta buena absorción y una adecuada concentración sérica, por su inocuidad se considera como fármaco de primera elección. Algunas bacterias son resistentes o adquieren resistencia debido a la producción de B-lactamasas.

DOSIS: Cada 8 horas por 3 a 5 días.

DOSIFICACIÓN DE AMOXCLAUS:

ESPECIE	PESO VIVO (kg)	SUSPENSIÓN (ml)
CANINO Y FELINO	2,5	0,8
	5,0	1,6
	10	3,2
PORCINO	10	1,4
AVES	1	0,3

Cerdos: 10 mg/kg de peso.

Aves: 10 a 20 mg/kg de peso vivo.

Caninos y felinos: 10 a 22 mg/kg de peso vivo.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

PREPARACIÓN: Es necesario reconstituir la suspensión para lo cual se debe añadir 45 ml de agua hervida y fría en el frasco de **AMOXCLAUS** polvo para suspensión, agitar hasta obtener una suspensión homogénea esto en el caso que sea para caninos o felinos.

En caso que el producto sea para porcinos o aves adicionar 25.7 litros de agua/10 kg de polvo suspensión y agitar hasta obtener una suspensión homogénea.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a las penicilinas, cefalosporinas. Los síntomas son: Anafilaxis, fiebre, molestias gastrointestinales.

ADVERTENCIAS: Las penicilinas están contraindicadas en los pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a ellas. No administrar penicilinas, cefalosporinas o macrólidos a conejos, cobayos, chinchillas, hámsteres, etc., porque puede ocurrir una grave enteritis y enterotoxemia clostridial.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: Las penicilinas cruzan la placenta; no se ha establecido su uso seguro durante la preñez pero tampoco se ha documentado ningún problema teratogénico asociado con esta droga.

REACCIONES ADVERSAS: Los efectos adversos con las penicilinas no suelen ser importantes y tienen una frecuencia de presentación relativamente baja. Las reacciones de hipersensibilidad no relacionadas con la dosis pueden ocurrir con estos agentes y se

pueden manifestar como erupciones cutáneas, fiebre, eosinofilia, neutropenia, agranulocitosis, trombocitopenia, leucopenia, anemia, linfadenopatía o anafilaxia completa.

Cuando se administran por vía oral, las penicilinas pueden causar efectos gastrointestinales (anorexia, vómitos, diarreas), debido a que pueden alterar la flora intestinal; puede ocurrir la diarrea asociada con los antibióticos y permitir la proliferación de bacterias resistentes en el colon (superinfección).

Las dosis altas o el uso prolongado se han asociado con Neurotoxicidad (ataxia en perros), pueden alterarse las enzimas hepáticas, otros efectos en los perros incluyen taquipnea, disnea, edema y taquicardia.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: No usar con cloranfenicol, eritromicina y otros macrólidos, tetraciclinas, sulfonamidas, etc, debido a que se produciría antagonismo.

La amoxicilina puede disminuir la excreción del metotrexato, aumentando el nivel de la droga y los posibles efectos tóxicos.

TIEMPO DE RETIRO: 20 días.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Venta Bajo Receta Médica.

PRESENTACIONES:

Frasco x 60 ml.

Funda x 10 kg.

REGISTRO: 2C-11207-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador