

AMOXIFLOX



Antibiótico de amplio espectro
Polvo soluble



COMPOSICIÓN: Cada 1 kg contiene:

Amoxicilina Trihidratada 200 g
 Ciprofloxacina HCL..... 200 g
 Excipientes c. s. p..... 1 kg

INDICACIONES: La acción sinérgica de los principios activos de **AMOXIFLOX**, intervienen en el tratamiento y control de infecciones del tracto urinario, respiratorio y de tejidos blandos en aves y porcinos, ocasionadas por *Campylobacter*, *Escherichia coli*, *Haemophilus*, *Mycoplasma*, *Pasteurella*, *Salmonella*, *Actinobacillus pleuroneumoniae*, *Streptococcus suis*, *Pasteurella multocida*.

USO VETERINARIO.

DOSIS:

Vía oral, disolver **AMOXIFLOX** en agua y proporcionar como única fuente de bebida.

Aves y porcinos: 6.5 g de **AMOXIFLOX** en 10 litros de agua, cada 24 horas por 3 a 5 días consecutivos o a criterio del Médico Veterinario.

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES:

- No administrar en aves productoras de huevo para consumo humano.
- Contraindicado en animales con antecedentes de hipersensibilidad a los principios activos.
- No administrar en animales con septicemia, shock u otras patologías graves, donde la absorción intestinal del antibiótico este significativamente disminuida.
- No administrar penicilinas junto con tetraciclinas, macrólidos o similares, ya que son antagónicos.
- No utilizar el producto después de la fecha de caducidad.
- Las principales causales de resistencia antibacteriana, corresponden a la subdosificación o sobredosificación.

RECOMENDACIONES:

- Privar a los animales de toda fuente de agua en las horas previas a su administración, para favorecer el consumo total de la solución.
- Una vez preparada la solución, administrar inmediatamente y no guardar sobrantes.
- Se recomienda revisar el pH del agua, dado que puede afectar la solubilidad del principio activo, biodisponibilidad y estabilidad.
- La limpieza de las tuberías, bebederos y otros es fundamental para la eficacia del tratamiento.
- Es un asunto de responsabilidad administrar antibacterianos a las dosis terapéuticas para lograr concentraciones plasmáticas y tisulares óptimas.
- Venta bajo prescripción Médico Veterinaria.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura entre 15°C y 30°C, protegidos de la luz.

TIEMPO DE RETIRO:

Carne: 10 días.

PRESENTACIONES:

Sobre x 100 g
 Funda x 1 kg

Saco x 25 kg

REGISTRO: Ecuador Reg. No. RIP – FAR -84

DISTRIBUIDO POR: JAMES BROWN PHARMA

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23.5, Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pífo. Quito – Ecuador - PBX: (593-2) 399-7000 - www.jamesbrownpharma.com