

APETOVIT INY



Multivitámico- estimulante del apetito
Solución inyectable



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Buclizina (HCL).....	50 mg
Sulfato Ferroso	140 mg
Tiamina (Vitamina B ₁).....	1.100 mg
Riboflavina (Vitamina B ₂).....	450 mg
Piridoxina (Vitamina B ₆).....	2.200 mg
Cianocobalamina (Vitamina B ₁₂).....	6 mg
Ácido Pantoténico (D-Pantenol).....	600 mg
Niacinamida.....	6.200 mg
Ácido Ascórbico (Vitamina C).....	600 mg
Vehículo c.s.p.....	100 ml

INDICACIONES: Está indicado en caso de falta de apetito, su componente Buclizina, actúa como potente estimulante no hormonal del apetito y crecimiento, recomendado además como antianémico y vigorizante orgánico.

En caso de hipovitaminosis del Complejo B en requerimientos aumentados como: Estados carenciales, estrés, desnutrición, nerviosismo, convalecencia.

DOSIS:

Bovinos y Equinos:

2,5 ml = 100 kg

5 ml = 200 kg

10 ml = 300 kg

15 ml = 400 kg

No administrar más de 15 ml por animal.

Porcinos:

0,5 ml = 20 kg

2 ml = 80 kg

4 ml = 160 kg

6 ml = 240 kg

No administrar más de 6 ml por animal.

Tratamiento de 1 a 3 aplicaciones.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.

PREPARACIÓN: Ninguna. Producto listo para su aplicación.

CONTRAINDICACIONES: No usar en pacientes que tienen hipersensibilidad conocida al producto o a uno de sus componentes. No sobre dosificar y aplicar en especies no aprobadas.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA:

Usar con precaución en gestación o lactancia.

ADVERTENCIAS: Utilizar el producto con precaución en pacientes que padecen de glaucoma o que tienen una predisposición a la retención urinaria. No combinar el producto con otros fármacos.

REACCIONES ADVERSAS:

La Buclizina puede causar efectos adversos cuando se sobre dosifica mientras que las vitaminas hidrosolubles rara vez producen toxicidad.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN:

No usar en conjunto con fármacos depresores del sistema nervioso central, tales como ansiolíticos, analgésicos opioides, hipnóticos y neurolépticos, por la posibilidad de potenciación de los efectos sedantes de la Buclizina.

TIEMPO DE RETIRO: Ninguno.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, pro-

tegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Frasco x 20 ml.

Frasco x 100 ml.

Frasco x 500 ml.

REGISTRO: 10A-9862-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador