

APETOVIT



Estimulante del apetito, antianémico y vigorizante
Jarabe



COMPOSICIÓN: Cada 10 ml contiene:

Bucliclina	5 mg
Sulfato Ferroso	140 mg
Tiamina (Vitamina B ₁)	1 mg
Riboflavina (Vitamina B ₂)	1 mg
Piridoxina (Vitamina B ₆)	0,5 mg
Cianocobalamina (Vitamina B ₁₂)	5 mcg
Ácido Pantoténico (D-Pantenol)	1 mg
Niacinamida	5 mg
Ácido Ascórbico (Vitamina C)	35 mg
Vehículo c.s.p	10 ml

INDICACIONES: Está indicado en caso de disminución del apetito, su componente Bucliclina, actúa como potente estimulante no hormonal del apetito y crecimiento, recomendado además como antianémico y vigorizante orgánico.

En caso de hipovitaminosis del Complejo B en requerimientos aumentados como: Preñez, lactancia, estados carenciales, estrés, desnutrición, nerviosismo, convalecencia. Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades.

DOSIS:

Bovinos y Equinos: 20 ml/100 kg.

Porcinos, Ovinos y Caprinos: 5 ml/20 kg.

Caninos Cachorros: 5 ml hasta 30 kg.

Caninos Adultos: 5-10 ml sobre 30 kg.

Felinos: 2-5 ml según el tamaño.

Aves: 100 ml en 100 litros de agua.

Nota: 0.16 ml de **APETOVIT** por kg de peso vivo en caninos, felinos y aves.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

PREPARACIÓN: Puede administrarse con agua de bebida.

CONTRAINDICACIONES: No usar en pacientes que tienen hipersensibilidad conocida al producto o a uno de sus componentes. No sobredosificar y aplicar en especies no aprobadas.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: Usar con precaución en gestación o lactancia.

ADVERTENCIAS: Utilizar el producto con precaución en pacientes que padecen de glaucoma o que tienen una predisposición a la retención urinaria. No combinar el producto con otros fármacos.

REACCIONES ADVERSAS:

La Bucliclina puede causar efectos adversos cuando se sobre dosifica mientras que las vitaminas hidrosolubles rara vez producen toxicidad.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: No usar en conjunto con fármacos depresores del sistema nervioso central, tales como ansiolíticos, analgésicos opioides, hipnóticos y neurolepticos, por la posibilidad de potenciación de los efectos sedantes de la Bucliclina.

TIEMPO DE RETIRO: Ninguno.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, de 15°C a 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Gotero x 20 ml.

Caja jeringa x 60 ml.

Caja jeringa x 100 ml.

Frasco x 1 litro.

Galón x 3.8 litros.

Caneca x 20 litros.

REGISTRO: 10A-7886-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador