

ATOPICA™ 25 MG



Para el tratamiento de dermatitis atópica crónica en perros
Cápsula blanda



COMPOSICIÓN GARANTIZADA: Cada cápsula contiene:

Ciclosporina	25 mg
Excipientes c.s.p	419.75 mg

INDICACIONES:

- Tratamiento de la dermatitis atópica crónica en perros.
- La dermatitis atópica es una de las enfermedades alérgicas de la piel más común en perros y está causada por alérgenos tales como ácaros del polvo o polen, que estimulan una respuesta inmune exagerada en los perros atópicos. La enfermedad es crónica, recurrente y requiere un control a lo largo de toda la vida. La ciclosporina actúa selectivamente sobre las células inmunes implicadas en la reacción alérgica. La ciclosporina reduce la inflamación y el picor asociados con la dermatitis atópica.

MODO DE USO:

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Introduzca la cápsula directamente en la boca del perro.

- Administrar por lo menos dos horas antes o después de la comida.

DOSIS: La dosis media recomendada de ciclosporina es de 5 mg/kg de peso corporal administrados por vía oral. **ATOPICA™ 25 MG**, está indicado para perros con un peso de 4 a < 7.5 kg.

- Inicialmente **ATOPICA™ 25 MG** se administrará diariamente hasta que se vea una mejoría clínica satisfactoria. Esto generalmente sucede en un plazo de 4 semanas. Si no existe mejoría durante las primeras 8 semanas, se debe parar el tratamiento.
- Una vez que se han controlado satisfactoriamente los síntomas clínicos de la dermatitis atópica, se puede dar **ATOPICA™ 25 MG** a días alternos como dosis de mantenimiento. El veterinario deberá hacer controles clínicos a intervalos regulares y ajustar la frecuencia de administración a la respuesta clínica obtenida.
- En los casos en los que se controlen los síntomas con una administración a días alternos, el veterinario puede decidir dar **ATOPICA™ 25 MG** cada 3 o 4 días. Antes de reducir el intervalo de tratamiento se debe considerar el dar un tratamiento adicional (p.e. champúes medicados, ácidos grasos).
- Se puede parar el tratamiento cuando los síntomas clínicos hayan sido controlados. Si los síntomas clínicos reaparecen, se puede reanudar el tratamiento a una dosis diaria, en algunos casos serán necesarias varias tandas de tratamiento.

ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES/ RECOMENDACIONES:

- Uso veterinario.
- Consulte al médico veterinario.
- Leer la etiqueta y el inserto antes de usar el producto.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No usar en casos de hipersensibilidad a la ciclosporina o a alguno de los excipientes.
- Para cualquier concentración de las cápsulas, no usar en perros de menos de seis meses de edad o menos de 2 kg de peso.
- No usar en animales con historia clínica de tumores malignos.
- No vacunar con una vacuna viva durante el tratamiento o durante las dos semanas previas o posteriores al mismo.
- Antes de empezar el tratamiento deben descartarse otras causas de dermatitis. Es una buena práctica tratar las infestaciones por pulgas antes y durante el tratamiento de la dermatitis atópica.
- Se recomienda eliminar las infecciones bacterianas y fúngicas antes de administrar **ATOPICA™ 25 MG**.
- Debería realizarse un examen clínico completo antes del trata-

miento.

- No se recomienda el uso de **ATOPICA™ 25 MG** en perros diabéticos.
- No se recomienda el uso concomitante de otros agentes inmunosupresores.
- La seguridad de **ATOPICA™ 25 MG** no ha sido establecida en perros reproductores ni en perras gestantes o lactantes.
- Durante el uso concomitante de ketoconazol y la ciclosporina, se debe considerar aumentar el intervalo de tratamiento si el perro está en dosis diaria.
- La administración conjunta de ciclosporina con lactonas macrocíclicas puede resultar en signos de toxicidad del SNC. No se recomienda el uso concomitante con aminoglucósidos y trimetoprim.

PRECAUCIONES PARA LA PERSONA QUE ADMINISTRA EL PRODUCTO:

Lavar manos luego de administración y en caso de ingestión accidental de la cápsula o su contenido, buscar atención médica inmediatamente y mostrar la caja o inserto al médico.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- No conservar a temperatura superior a 30°C.
- Conservar en el blíster. Mantener el blíster en el embalaje exterior de cartón.
- Venta bajo receta médica.

PRESENTACIÓN:

Caja x 30 cápsulas.

REGISTRO: 11A-15170-AGROCALIDAD

ELABORADO POR: ELANCO.