

ATRAFIX FC Pour On



Inhibidor del desarrollo de las garrapatas en bovinos por acción sistémica



COMPOSICIÓN: Por 100 ml

Fluazuron..... 2.5 g
Cipermetrina 5 g

ATRAFIX Pour On está indicado para el control de la garrapata común *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* en bovinos.

Los terneros que se alimenten de su madre antes del destete, no necesitan ser tratados mientras su madre esté siendo tratada con **ATRAFIX Pour On** ya que, estarán protegidos a través de la leche materna.

MODO DE ACCION: El Fluazuron pertenece al grupo químico de las benzoilureas. Una vez aplicado, llega a las garrapatas a través de la sangre del huésped por acción sistémica e interfiere en la formación de quitina, componente principal de su exoesqueleto. De esta manera se impide la eclosión de huevos y la maduración de larvas y ninfas interrumpiéndose de esta forma el ciclo reproductivo.

Aplicar al inicio de la temporada donde la infestación de garrapatas es estacional. En casos de aplicaciones de control, cada 8 a 12 semanas según el grado de infestación.

Pueden haber factores que influyan sobre el efecto de **ATRAFIX Pour On** tales como alta infestación del potrero y de los animales tratados, potreros que alojan animales sin tratar, métodos de rotación de potreros, clima y época del año, etc.).

FORMA DE USAR: Se recomienda aplicar en dos franjas sobre la línea media del lomo del animal desde la cruz hasta la base de la cola utilizando el aplicador apropiado para el producto.

Por razones obvias no se deben tratar animales mojados pero, pasadas unas dos horas de la aplicación, aun la lluvia no afectará la eficacia del producto.

El poder residual contra la garrapata del bovino es de 25 días con un porcentaje de eficacia del 99.95%

La dosis de **ATRAFIX Pour On** es de 10 ml por 100 kg de peso vivo.

PRECAUCIONES DE USO:

- Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de que el producto se derrame sobre la piel, lavar el área inmediatamente con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección personal.
- No fumar ni comer durante su uso.
- Mantener fuera del alcance de los niños y NO almacenar junto a alimentos para animales.
- El producto es tóxico para los invertebrados acuáticos.
- En caso de derrames, aplique material absorbente (arena-ase-rín) para recoger, coloque en un recipiente cerrado y rotulado, lave el sitio del derrame con abundante agua y jabón.

RESTRICCIONES DE USO:

- Suspender el tratamiento 45 días antes del sacrificio.
- No administrar a vacas lecheras en producción.
- Conservar en su envase original entre 15° y 30°C alejado de la luz solar directa.

REGISTRO: RIP-FAR-43

PRODUCIDO POR VETANCO – ARGENTINA

DISTRIBUYE PARA EL ECUADOR: TADEC CÍA. LTDA. Ambato - Quito - Guayaquil - Cuenca - Balsas - Sto. Domingo.