

AVICORIZA



Vacuna contra la Coriza Infecciosa Aviar Suspensión inyectable



FÓRMULA: Cada dosis contiene:

Colonias inactivadas de
Avibacterium paragallinarum serotipo A3X10⁹ UFC
Colonias inactivadas de
Avibacterium paragallinarum serotipo B3X10⁹ UFC
Colonias inactivadas de
Avibacterium paragallinarum serotipo C3X10⁹ UFC
Excipientes c.s.p. 1 dosis

ESPECIES: Aves.

DOSIS DE AVICORIZA:

ESPECIE	DOSIS	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
AVES	1 dosis = 0.5 ml	Subcutánea en la región de la pechuga.

VACUNACIÓN: Se recomienda 2 aplicaciones a las 6-8 semanas de edad y antes de comenzar la postura 16-18 semanas respectivamente.

INDICACIONES DE USO: Bacterina indicada para la prevención de la enfermedad Coriza Aviar, brinda una amplia protección para los serotipos A, B y C de *Avibacterium paragallinarum*.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vía subcutánea en la región de la pechuga.

DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD: Coriza Infecciosa Aviar: enfermedad infectocontagiosa de origen bacteriano y curso agudo que afecta primariamente al sistema respiratorio superior de las aves, caracterizándose clínicamente por producir catarro nasal (coriza) y edema con hinchazón facial (cara).

Afecta a pollos y gallinas de cualquier edad. Las manifestaciones clínicas más importantes se observan en las aves adultas. Ocasionalmente importantes pérdidas económicas por disminución en los índices de postura, retraso en el crecimiento de las aves, aumento del descarte, reposición de aves, entre otros.

MECANISMO DE ACCIÓN: Estimula al sistema inmune para la producción de anticuerpos contra antígenos bacterianos específicos, previniendo la colonización de las bacterias: *Avibacterium paragallinarum* serotipos A, B y C. Evitando así la presentación clínica de la Coriza aviar.

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES:

- No vacunar animales enfermos, administrar el producto solo a animales sanos.
- No congelar.

INTERACCIONES: No reportado.

REACCIONES ADVERSAS:

- En casos extremadamente escasos, puede presentarse una reacción alérgica a la aplicación de la vacuna.
- No existe un antídoto específico el tratamiento es netamente sintomático.

PRESENTACIONES:

Frasco x 10 ml (20 dosis)
Frasco x 500 ml (1 000 dosis)

REGISTRO: 4C-12001-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha
Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag
Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021
SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246
www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador