

AVIPRO™ MG F

Contra la micoplasmosis aviar
Solución inyectable



COMPOSICIÓN: Cada dosis contiene no menos de:
Mycoplasma gallisepticum, cepa F, $7.94 \times 10^{6.0}$ UCC (unidades cambio de color).

ESPECIES DE DESTINO: Aves (pollas).

INDICACIONES: Recomendado como ayuda en la prevención de los síntomas clínicos de infección con *Mycoplasma gallisepticum* (MG) en pollas.

MODO DE USO: Vacunar las pollas sanas por el método de agua de bebida a las 12 semanas de edad o mayores pero 4 semanas antes de iniciar la producción de huevos.

Preparación de la vacuna: Prepare la vacuna solamente en el momento en que vaya a usarse. Remueva cualquier desinfectante del agua de bebida 24 horas antes y después de la vacunación. Lave todos los bebederos con agua limpia. No usar desinfectantes.

Mezcle la vacuna con el agua de bebida libre de desinfectantes. Debe usarse leche descremada en polvo para estabilizar la vacuna en proporción de ½ onza por galón o 2 gramos por litro.

Provea amplio espacio para que todas las aves puedan beber fácilmente. El agua que contiene la vacuna debe ser consumida en 2 horas o menos. Para asegurarse que todas las aves beban, restrinja el agua por una hora antes de la vacunación. No se recomienda la administración a través de las líneas de agua utilizando un dosificador o tanque de medicación.

ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES/ RECOMENDACIONES:

- Uso veterinario.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y los animales domésticos.
- Use todo el contenido una vez abierto el frasco.
- Vacune solamente pollas sanas.
- No usar antibióticos 3 días antes o después de la vacunación contra MG.
- No usar vacunas para la enfermedad de Newcastle o bronquitis dentro de los 7 días antes o después de la vacunación contra MG.
- Evitar el contacto con pollos vacunados.
- No vacunar pavos.
- Lave las manos cuidadosamente después de usar el producto.
- Mantenga los registros permanentes de vacunación incluyendo el número de lote de la vacuna.
- Disponer los residuos con un gestor autorizado por la autoridad sanitaria y ambiental.

TIEMPO DE RETIRO: No vacunar 21 días antes del sacrificio.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Almacene en un lugar oscuro entre 2°- 8°C.
- No congelar. Venta bajo receta médica

PRESENTACIÓN:

Frasco de vidrio x 1 000 dosis.

REGISTRO: RIP-BIO-17

ELABORADO POR: ELANCO.