

AVIPRO THYMOVAC



Vacuna contra la Anemia Infecciosa Aviar
Oral



COMPOSICIÓN: Cada dosis de vacuna contiene mínimo: $10^{4.5}$ - $10^{5.5}$ DICT₅₀ de virus vivo de Anemia Infecciosa Aviar (CAV) cepa CUX -1.

DESCRIPCIÓN: AVIPRO THYMOVAC es una vacuna a virus vivo de origen en embriones de pollo originados de huevos SPF.

INDICACIONES DE USO: Recomendado para administración en gallinas reproductoras a partir de la 8ª semana después de la reconstitución para la inmunización activa de gallinas reproductoras sanas y susceptibles no más tarde de 6 semanas antes del comienzo de la postura, a fin de asegurar que la inmunidad protectora se haya desarrollado antes de dicho periodo para la inmunización pasiva de su progenie contra la Anemia Infecciosa Aviar. La inmunización activa comienza a partir de la 4ª con una duración de 43 semanas (demostrado por inoculación).

Para la protección pasiva proporcionada a la progenie contra los síntomas clínicos y las lesiones de la anemia del pollo está garantizada durante y hasta las 51 semanas después de la vacunación de la reproductora, y los pollos están protegidos desde el primer día de edad (como ha sido demostrado por inoculación) no más tarde de 6 semanas antes del comienzo de la postura, a fin de asegurar que la inmunidad protectora se haya desarrollado antes de dicho periodo.

PRECAUCIONES: El virus de la vacuna se puede propagar entre las gallinas o los pollos no vacunados, ya que es excretado en las heces durante 14 días como mínimo. Puesto que el virus puede causar síntomas clínicos en pollos muy jóvenes, se deberá evitar la transmisión a aves no protegidas. Evite la propagación a gallinas en producción, a aves que estén próximas a la postura y aves jóvenes de menos de 3 semanas de edad. La vacuna no se deberá usar en galpones con aves de diferentes edades.

El virus de la vacuna se puede encontrar en diferentes órganos y tejidos entre los días 7 y 49 posteriores a la vacunación.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Agua de bebida.

Suministrar la vacuna de acuerdo a las instrucciones del inserto anexo al producto.

Una vacunación insuficiente podrá reducir la eficacia. Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). No congelar. Incinerar los envases y contenido sin usar.

PRESENTACIONES:

Frascos x 1 000 dosis.

Caja de 10 x 1 000 dosis.

REGISTRO: 4A-7624-AGROCALIDAD

ELABORADO POR: ELANCO