

AVTILL



Antibacteriano de amplio espectro
Solución oral



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Tilmicosina.....	23,50 g
Vehículo c.s.p.....	100 ml

INDICACIONES: Está indicado para el tratamiento y control de infecciones respiratorias relacionadas con *Mycoplasma gallisepticum* y *Mycoplasma synoviae*, *Ornithobacterium rhinotracheale* y *Pasteurella multocida*.

DOSIS: Dosificación en el agua de bebida.

Recepción: 1-7 días de edad 2 mg/pollo por tres días.

Dosis diaria: 8 ml AVTILL para 1 000 pollos.

Post-vacunal mayores de 1 semana: 15-20 mg/kg de peso de 1 a 3 días.

Al agua de bebida: 0.3 ml de AVTILL por litro de agua.

Dosis diaria: 30 ml AVTILL para 1 000 pollos de 500 g cada uno.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

PREPARACIÓN: Con agua de bebida.

CONTRAINDICACIONES: Ocasionalmente puede provocar alergia, en este caso suspenda el tratamiento y si es necesario aplique antihistamínico.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: El uso en productoras no ha sido demostrado.

ADVERTENCIAS: Una vez realizada la dilución en el agua de bebida, esta debe consumirse totalmente. Solo para uso oral no inyectar. No utilizar en aves productoras de huevos para el consumo humano.

REACCIONES ADVERSAS: No se ha reportado por vía oral.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: Ninguna reportada.

TIEMPO DE RETIRO: Carne 9 días.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

- Gotero x 10 ml.
- Frasco x 50 ml
- Frasco x 240 ml
- Frasco x 1 000 ml

REGISTRO: 2C1-10986-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador