

AZITROX



Antibiótico
Solución oral



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Azitromicina 12,5 g
Vehículo c.s.p 100 ml

INDICACIONES: Está indicado para el tratamiento y control de infecciones respiratorias en aves, con efecto antiinflamatorio y disminución de los problemas gastrointestinales.

DOSIS: Se sugiere una dosis de 10 mg de Azitromicina/kg de peso vivo por vía oral.

Se debe administrar 0.8 ml de **AZITROX** en un litro de agua de bebida, para obtener la dosis recomendada.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

PREPARACIÓN: Adicionar agua de bebida.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad conocida a la droga, macrólidos y eritromicina.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: No se cuenta con información durante la etapa de puesta.

ADVERTENCIAS: No se recomienda en otra especie que no sea la autorizada.

REACCIONES ADVERSAS: La Azitromicina puede causar problemas gástricos si se administran altas dosis.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: Los antiácidos orales que contengan magnesio y aluminio pueden reducir la velocidad de absorción de la Azitromicina; se sugiere la administración de estos productos con un intervalo de 2 horas.

La Azitromicina podría aumentar los niveles sanguíneos de la ciclosporina; administrar con cuidado.

TIEMPO DE RETIRO: Dos días antes del sacrificio.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15° a 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Gotero x 5 ml.
Frasco x 50 ml.
Frasco x 1 litro.
Galón x 3.8 litros.
Caneca x 20 litros.

REGISTRO: 2B-11154-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha
Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag
Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246
www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador