

BACTRIVET AVES



Antibiótico
Suspensión oral



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Sulfametoxazol	38 g
Trimetoprim	8 g
Bromhexina	0,1 g
Vehículo c.s.p	100 ml

INDICACIONES DE USO: Está indicado en el tratamiento y control de enfermedades infecciosas del tracto respiratorio complicadas con secreción mucosa anormal.

DOSIS DE BACTRIVET AVES:

ESPECIE	EDADES SEMANAS	ml DE BACTRIVET POR CADA 10 LITROS DE AGUA	NÚMERO DE AVES
AVES	1	12	357
	2	12	153
	3	12	89
	4	14	60
	5	16	48
	6 o más	19	41

Dosis de referencia:
Sulfametoxazol + Trimetoprim 100 mg/kg.
Bomhexina 0.25 mg/kg cada 12 horas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

Administrar la dosis indicada cada 12 horas durante 3 a 5 días durante 3 a 5 días salvo mejor criterio del Médico Veterinario.

PREPARACIÓN: Debe ser disuelto en el agua de bebida.

CONTRAINDICACIONES:

- Puede presentarse síntomas de intolerancia gastrointestinal, reacciones alérgicas.
- Dosis grandes durante periodos prolongados puede dar lugar a síndromes hemorrágicos, por lo que debe evitarse tratamientos largos, en particular en animales jóvenes.
- Ocasionalmente, las sulfonamidas provocan cristaluria, en particular cuando el pH urinario es bajo.
- Debe usarse con precaución en pacientes con enfermedad hepática preexistente.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: Se debe respetar el tiempo de retiro en aves de postura.

ADVERTENCIAS:

- No usar en animales con insuficiencia renal aguda o glomerulonefritis.
- Utilizar preparaciones frescas y desechar los sobrantes.
- Usar guantes, especialmente cuando se trata un grupo de animales.
- No se recomienda en otra especie que no sea la autorizada.

REACCIONES ADVERSAS: En aves no hay reportes.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: Los antiácidos pueden disminuir la biodisponibilidad de las sulfonamidas, si se administra de forma concurrente.

La ciclosporina si se administra en conjunto con trimetoprim/sulfa aumenta el riesgo de nefrotoxicidad.

La warfarina si se administra en conjunto con trimetoprim/sulfa puede prolongar el INR y el tiempo de protrombina.

CONDUCTA DE EMERGENCIA: Suspender inmediatamente la administración del medicamento.

ANTÍDOTO: No existe un antídoto específico por lo que el tratamiento es netamente sintomático.

TIEMPO DE RETIRO:

Carne: 7-8 días.

Huevos: 10 días.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15° a 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Venta Bajo Receta Médica.

PRESENTACIONES:

Frasco x 1 litro.

Galón x 3.8 litros.

REGISTRO: 2B1-11251-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador