

BACTRIVET FARBIOVET



Antibiótico para infecciones de vías respiratorias, renales y gastrointestinales

Suspensión oral



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Sulfametoxazol.....	8 g
Trimetoprim.....	1,6 g
Vehículo c.s.p.....	100 ml

INDICACIONES: Infecciones de vías respiratorias, inferiores y superiores, bronquitis, neumonía. Infecciones renales y de vías urinarias. Infecciones gastrointestinales.

Producidos por *Actinomyces* spp., *Actinobacillus* spp., *Aeromonas* spp., *Bordetella* spp., *Brucella* spp., *Corynebacterium* spp., *E. coli*, *Fusiformis* spp., *Klebsiella* spp., *Listeria monocytogenes*, *Mycobacterium* spp., *Neisseria* spp., *Nocardia* spp., *Staphylococcus* spp. (incluyendo cepas penicilinasas +), *Streptococcus* spp. (incluyendo enterococos y diplococos), *Campylobacter* spp.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN DE BACTRIVET FARBIOVET:

ESPECIE	DOSIS DE REFERENCIA 15 mg/kg/12 h	INDICACIONES
CANINOS	5 ml por cada 25 kg de peso vivo cada 12 horas por 3 a 5 días.	Infecciones causadas por patógenos susceptibles.
	DOSIS DE REFERENCIA 30 mg/kg/24 h 8 ml por cada 25 kg de peso vivo cada 24 horas por 10 días.	Coccidiosis
FELINOS	DOSIS DE REFERENCIA 15 mg/kg/12 h 0.5 ml por cada 3 kg de peso vivo cada 12 horas de 7 a 14 días.	Infecciones de tejidos blandos y del tracto urinario
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. La duración del tratamiento, la dosis y la frecuencia de administración del producto puede ser modificado a criterio del Médico Veterinario.		

PREPARACIÓN: Ninguna.

CONTRAINDICACIONES: Dosis grandes durante periodos prolongados puede dar lugar a síndromes hemorrágicos, por lo que debe evitarse tratamientos largos, en particular en animales jóvenes.

Ocasionalmente, las sulfonamidas provocan cristaluria, en particular cuando el pH urinario es bajo.

Debe usarse con precaución en pacientes con enfermedad hepática preexistente.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: La seguridad del uso de la trimetoprim/sulfa en animales gestantes no ha sido establecida con claridad. Se han documentado efectos teratogénicos (paladar hendido). Estudios en hembras caninas y felinas preñadas se indica que su uso es seguro si se la emplea con cuidado.

Usar con cuidado en los animales en lactación.

ADVERTENCIAS: Hipersensibilidad a los componentes, recién nacidos, preñez, insuficiencia renal y/o hepática.

Puede provocar conjuntivitis seca en pequeñas especies. En tratamientos de 10 días se puede desarrollar poliartritis y fiebre que ceden al suspender la terapia. Los perros de raza Doberman son particularmente susceptibles a presentar reacciones adversas, incluyendo reacciones cutáneas graves.

REACCIONES ADVERSAS: En caninos incluye: Queratoconjuntivitis seca (la cual puede ser irreversible), hepatitis neutrofílica aguda con ictericia, vómitos, anorexia, diarrea, fiebre, anemia hemolítica, urticaria, poliartritis, edema facial, polidipsia, poliuria y colestasis. Las sulfonamidas potenciadas pueden causar hipotiroidismo en los perros, en particular con tratamiento prolongado. Las reacciones de hipersensibilidad parecen ser más comunes en las razas caninas de gran talla, entre las cuales, el Doberman pinscher es posiblemente, más susceptible.

Los efectos adversos observados en gatos pueden incluir anorexia, leucopenia y anemia.

Las sulfonamidas (o sus metabolitos) pueden precipitar en la orina, en particular cuando se las da a altas dosis durante tiempo prolongado. La orina ácida o muy concentrada puede también contribuir a un aumento del riesgo de cristaluria, hematuria y obstrucción de los túbulos renales.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: Los antiácidos pueden disminuir la biodisponibilidad de las sulfonamidas, si se administra de forma concurrente.

La ciclosporina si se administra en conjunto con trimetoprim/sulfa aumenta el riesgo de nefrotoxicidad.

La warfarina si se administra en conjunto con trimetoprim/sulfa puede prolongar el INR y el tiempo de protrombina.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15° a 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Venta Bajo Receta Médica.

PRESENTACIONES:

Frasco x 60 ml con jeringa dosificadora

REGISTRO: 2B1-12834-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador