

BACTRIVET POLVO



Antibacteriano de amplio espectro
Polvo oral



COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:

Sulfametoxazol	20,0 g
Trimetoprim	4,0 g
Tilosina	3,0 g
Excipientes c.s.p.....	100 g

INDICACIONES: Está indicado en el tratamiento y control de enfermedades infecciosas del tracto digestivo y respiratorio, infecciones del tracto urinario, septicemia, neumonía, coccidiosis, enteritis, disentería e infecciones secundarias de terneros, porcinos y aves.

DOSIFICACIÓN DE BACTRIVET POLVO:

ESPECIES	INDICACIONES	DOSIS BACTRIVET POLVO	
TERNEROS	Infecciones de vías respiratorias y digestivas, diarreas y abscesos.	8 g cada 40 kg de peso vivo cada 24 horas.	
		20 g cada 100 kg de peso vivo cada 24 horas.	
PORCINOS	Diarreas infecciosas, abscesos, septicemias, neumonías.	8 g cada 64 kg de peso vivo cada 24 horas.	
		20 g cada 160 kg de peso vivo cada 24 horas.	
AVES	EDAD SEMANAS	GRAMOS DE BACTRIVET EN 1 l DE AGUA	NÚMERO DE ANIMALES
		3	36
		3	15
		3	9
		4	6
		4	5
		5	4

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

En terneros y porcinos repetir el tratamiento cada 24 horas, en aves administrar con el agua de bebida cada 12 horas, por 3 a 5 días, salvo mejor criterio del Médico Veterinario.

PREPARACIÓN: Debe ser disuelta la dosis requerida en alimento o en agua de bebida.

CONTRAINDICACIONES:

- Pueden presentarse síntomas de intolerancia gastrointestinal, reacciones alérgicas.
- Dosis grandes durante periodos prolongados pueden dar lugar a síndromes hemorrágicos, por lo que debe evitarse tratamientos largos, en particular en animales jóvenes.
- Ocasionalmente, las sulfonamidas provocan cristaluria, en particular cuando el pH urinario es bajo.
- Debe usarse con precaución en pacientes con enfermedad hepática preexistente.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA:

No administrar cuando el animal está cerca del término de su preñez.

ADVERTENCIAS:

No usar en animales con insuficiencia renal aguda o glomerulonefritis.

Utilizar preparaciones frescas y desechar los sobrantes.

Usar guantes, especialmente cuando se trata un grupo de animales.

No se recomienda en otra especie que no sea la autorizada.

REACCIONES ADVERSAS: La Tilosina puede inducir grave diarrea en bovinos, en los porcinos los efectos adversos descritos incluyen edema de la mucosa rectal y leve protrusión anal con prurito, eritema y diarrea.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: Los antiácidos pueden disminuir la biodisponibilidad de las sulfonamidas, si se administra de forma concurrente.

La ciclosporina si se administra en conjunto con trimetoprim/sulfa aumenta el riesgo de nefrotoxicidad.

La warfarina si se administra en conjunto con trimetoprim/sulfa puede prolongar el INR y el tiempo de protrombina.

Se presenta antagonismo con los betalactámicos, lincomicina y clindamicina.

CONDUCTA DE EMERGENCIA: Suspender inmediatamente la administración del medicamento.

ANTÍDOTO: No existe un antídoto específico por lo que el tratamiento es netamente sintomático

TIEMPO DE RETIRO: Cerdos: 14 días/Bovinos: 21-30 días/Aves: 15 días.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Venta Bajo Receta Médica.

PRESENTACIONES:

- Sobre x 8 g.
- Sobre x 20 g.
- Sobre x 100 g.
- Sobre x 500 g.
- Sobre x 1 kg.
- Balde x 10 kg.

REGISTRO: 2C1-10985-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador