

BACTRIVET-ST



Antibiótico
Solución inyectable



COMPOSICIÓN:

Sulfadiazina	20 g
Trimetoprim	4 g
Vehículo c.s.p	100 ml

INDICACIONES: BACTRIVET-ST está indicado en el tratamiento de infecciones provocadas por *Staphylococcus* sp., *Corynebacterium* sp., *Bordetella* sp., *Clostridium* sp., y microorganismos Gram-negativos como *Proteus* sp., *Salmonella* sp., *Pasteurella* sp., y *Klebsiella* sp. Por ello se usa en infecciones de origen bacteriano de las vías respiratorias (bronquitis, neumonías, pleuroneumonías, rinitis), del sistema gastrointestinal (colibacilosis, salmonelosis, enteritis) y vías genito-uritarias (metritis, infecciones urogenitales, pielonefritis y uretritis). Además de usarse con mucho éxito en la coccidiosis en caninos y felinos se lo recomienda para otras infecciones como actinomicosis, mastitis, adenitis, necrobacilosis, pododermatitis, listeriosis, vibriosis, artritis infecciosa, heridas infectadas, infecciones de ombligo, septicemias, tratamiento post-operatorio o de las herida de consideración, como preventivo de infecciones.

DOSIS:

DOSIFICACIÓN DE BACTRIVET ST:

ESPECIE	DOSIS REFERENCIAL (mg/kg)	DOSIS DE BACTRIVET ST (ml)	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
BOVINOS	25	5 ml/50 kg	Intramuscular
TERNEROS	48	10 ml/50 kg	
EQUINOS	20	4 ml/50 kg	
PORCINOS	48	10 ml/50 kg	
CANINOS	25	1 ml/10kg	
FELINOS	25	0.5 ml/5 kg	Subcutánea
	30	0.6 ml/5 kg	
Administrar BACTRIVET ST cada 24 horas de 3 a 5 días o según el criterio del Médico Veterinario			

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vía IM profunda en bovinos, equinos, porcinos y caninos. En felinos se puede aplicar IM o SC (dependiendo del volumen a administrar).

CONTRAINDICACIONES: La combinación de trimetoprim/sulfadiazina no se debe administrar en perros, gatos o caballos que estén con daño hepático o renal, deshidratados, con acidosis metabólica, que presenten alteraciones del recuento hemático o antecedentes de sensibilidad a las sulfonamidas.

ADVERTENCIAS: Los perros de raza Doberman son particularmente susceptibles a presentar reacciones adversas, incluyendo reacciones cutáneas graves. Debe utilizarse con precaución en gatos, que han sido medicados con salicilatos, la dosis puede disminuirse un 25% y no emplearlos por más de 10 días. El producto no debe ser administrado en pacientes cuya dolencia sea causada por *Rickettsias*, *Leptospira* sp., *P. aeruginosa* y *Mycoplasma* sp., por ser resistentes a los principios activos de la fórmula.

REACCIONES ADVERSAS: En caninos incluye: queratoconjuntivitis seca (la cual puede ser irreversible), hepatitis neutrofílica aguda con ictericia, vómitos, anorexia, diarrea, fiebre, anemia hemolítica, urticaria, poliartritis, edema facial, polidipsia, poliuria y colestasis. Las sulfonamidas potenciadas pueden causar hipotiroidismo en los perros, en particular con tratamiento prolongado. Las reacciones de hipersensibilidad parecen ser más comunes en las razas caninas de gran talla, entre las cuales, el Doberman pinscher es posiblemente, más susceptible. Los efectos adversos observados en gatos pueden incluir anorexia, leucopenias y anemias. Las sulfonamidas (o sus metabolitos) pueden precipitar en la orina, en particular cuando se las da a altas dosis durante tiempo prolongado. La orina ácida o muy concentrada puede también contribuir a un aumento del riesgo de cristaluria, hematuria y obstrucción de los túbulos renales.

dismo en los perros, en particular con tratamiento prolongado. Las reacciones de hipersensibilidad parecen ser más comunes en las razas caninas de gran talla, entre las cuales, el Doberman pinscher es posiblemente, más susceptible. Los efectos adversos observados en gatos pueden incluir anorexia, leucopenias y anemias.

Las sulfonamidas (o sus metabolitos) pueden precipitar en la orina, en particular cuando se las da a altas dosis durante tiempo prolongado. La orina ácida o muy concentrada puede también contribuir a un aumento del riesgo de cristaluria, hematuria y obstrucción de los túbulos renales.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA:

La seguridad del uso de la trimetoprim/sulfa e animales gestantes no ha sido establecida con claridad. Se han documentado efectos teratogénicos (paladar hendido). Estudios en hembras caninas y felinas preñadas se indica que su uso es seguro si se la emplea con cuidado.

Usar con cuidado en los animales en lactación.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN:

Los antiácidos pueden disminuir la biodisponibilidad de las sulfonamidas, si se administra de forma concurrente.

La ciclosporina si se administra en conjunto con trimetoprim/sulfa aumenta el riesgo de nefrotoxicidad.

La warfarina si se administra en conjunto con trimetoprim/sulfa puede prolongar el INR y el tiempo de protrombina.

SOBREDOSIFICACIÓN (SÍNTOMAS, MEDIDAS DE URGENCIA, ANTÍDOTOS):

Las manifestaciones de una sobredosis aguda puede incluir signos clínicos de malestar gastrointestinal (náuseas, vómitos, diarrea), toxicidad neurológica central (depresión, confusión), edema facial, mielosupresión y aumento de las aminotransferasas séricas. La sobredosis oral puede ser tratada mediante procedimientos de vaciamiento gástrico y terapia de sintomática y de sostén.

TIEMPO DE RETIRO: Carne: Bovinos 10 días. Becerros y Lechones 28 días. Porcinos 10 días; Leche: 2 días y medio.

DECLARACIÓN DE VENTA: Venta Bajo Receta Médica.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

PRESENTACIONES:

Frasco por 10 ml.

Frasco por 50 ml.

Frasco por 100 ml.

REGISTRO: 2B1-14565-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador