

BALANCE CALCIO



Suplemento de vitaminas y minerales
Comprimidos saborizados



COMPOSICIÓN: Cada comprimido contiene:

Gluconato de Calcio	1,232 g
Fosforil de calcio.....	0,040 g
Vitamina B ₁	0,0008 g
Vitamina B ₆	0,0007 g
Vitamina C	0,009 g
Vitamina D ₃	0,028 g
Excipiente c.s.p.	1 comprimido

INDICACIONES: Está indicado en caninos con alta demanda de calcio y fósforo especialmente en etapas de crecimiento, hembras en gestación y en período de lactancia: así como también en casos de raquitismo, hipocalcemia, hipoparatiroidismo e hiperparatiroidismo nutricional secundario, procesos de recuperación ósea.

Se puede utilizar en procesos de recuperación de operaciones ortopédicas o fracturas. En felinos con problemas de hiperparatiroidismo nutricional secundario.

DOSIS DE BALANCE CALCIO:

ESPECIE	INDICACIONES	DOSIS
CANINOS	Hembras en gestación y en período de lactancia, raquitismo, hipocalcemia, hipoparatiroidismo e hiperparatiroidismo nutricional secundario, procesos de recuperación ósea.	1 comprimido/10 kg de peso corporal al día.
FELINOS	Tratamiento para hiperparatiroidismo nutricional secundario.	1 comprimido/10 kg peso corporal al día.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

CONTRAINDICACIONES: El calcio está contraindicado en pacientes con fibrilación ventricular o hipercalcemia.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: Aunque no se ha demostrado si la administración del producto de calcio es inocua durante la gestación, a menudo se usa antes, durante y después del parto en animales para tratar la paresia parturienta secundaria a hipocalcemia.

ADVERTENCIAS: El calcio debe usarse con gran cautela en pacientes que toman glucósidos digitálicos o tienen enfermedad cardíaca o renal.

REACCIONES ADVERSAS: La administración de calcio puede causar hipercalcemia, en especial en pacientes con enfermedad cardíaca o renal. La administración oral puede causar irritación gastrointestinal y/o constipación.

El efecto de dosis altas de vitamina C se asocia con riesgo de formación de cálculos.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN:

- La administración oral de calcio puede conducir a un aumento de la concentración sérica de magnesio y/o calcio, en particular en pacientes con insuficiencia renal.
- La administración oral de calcio puede disminuir la cantidad de tetraciclinas o fluoroquinolonas absorbidas a través del tracto

gastrointestinal; separar la administración de estas drogas por un lapso de 2 horas, si es posible.

- Diuréticos derivados de las tiacidas su uso en conjunto con grandes dosis de calcio puede causar hipercalcemia.
- La excesiva ingesta de vitamina A puede estimular la pérdida de calcio desde los huesos y causar hipercalcemia.
- El uso concurrente de grandes dosis de vitamina D o sus análogos puede causar un aumento de la absorción de calcio e inducir hipercalcemia.

TIEMPO DE RETIRO: Ninguno.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C a 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Venta Libre.

PRESENTACIONES:

Caja x 30 unidades

REGISTRO: 1F1-13853-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador