

**BAYCOX® 2,5 % SOLUCIÓN ORAL**

**Anticoccidiano para aves**  
Solución oral



**COMPOSICIÓN:** Cada ml de solución contiene:

Toltrazurilo ..... 25 mg  
Excipientes c.s.p. .... 1 ml

**INDICACIONES:** Tratamiento de la coccidiosis en pollos y pavos causada por infecciones con varias especies de Eimeria: Pollos: *E. acervulina*, *E. bruneli*, *E. máxima*, *E. necatrix*, *E. tenella* y *E. mitis*. Pavos: *E. adenoides* y *E. meleagrimitis*.

**MECANISMOS DE ACCIÓN: BAYCOX® 2,5 % SOLUCIÓN ORAL** ejerce un efecto coccidicida en todos los estados de desarrollo intracelular de la coccidia, como son la esquizogonia y gametogonia. Su actividad contra macro y microgametos le confiere una característica especial sobre otros compuestos anticoccidianos.

**BAYCOX® 2,5 % SOLUCIÓN ORAL** ejerce un defecto lesivo sobre la mitosis, sobre las mitocondrias y en los macrogametocitos sobre los cuerpos formadores de la pared. Provoca vacuolización del retículo endoplásmico en todos los estadios evolutivos intracelulares. Estas propiedades le confieren a **BAYCOX® 2,5 % SOLUCIÓN ORAL** un efecto coccidicida.

**PRECAUCIONES:** Evite la formación de espuma ya que puede afectar la exactitud de los sistemas de dosificación o de los bebederos.

**Precauciones especiales para su uso en animales:**

En concentraciones menores de 1 ml de **BAYCOX® 2,5 % SOLUCIÓN ORAL** por litro de agua potable, puede ocurrir precipitación. Se recomienda preparar la solución de **BAYCOX® 2,5 % SOLUCIÓN ORAL** - medicado en agua fresca cada día.

La solución preparada no debe ser usada después de 24 horas. Evitar el uso de otros aditivos en el agua de bebida.

**Precauciones para quien administra el producto en los animales:** **BAYCOX® 2,5 % SOLUCIÓN ORAL** es una solución alcalina. En caso directo con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua. Cuando administre el producto, no comer, beber o fumar.

**ADVERTENCIAS:** Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

**DOSIS:** 7 mg/kg de peso corporal al día por dos días consecutivos.

**MODO DE EMPLEO: BAYCOX® 2,5 % SOLUCIÓN ORAL** viene listo para agregarse en el agua de la bebida, lo cual facilita la administración y no interfiere con el manejo de la granja.

**TIEMPO DE RETIRO:** Los pollos no deben sacrificarse para consumo humano hasta 14 días después de finalizado el tratamiento. Los pavos no deben sacrificarse para consumo humano 16 días después de finalizado el tratamiento. No administrar en aves en producción, cuyos huevos se destinen a consumo humano.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:** Consevar entre 15°C y 30°C.

**MANTERIAL DE EMPAQUE:** Frasco de plástico blanco con tapa de rosca verde.

**CONCEPTO TOXICOLÓGICO:** No Aplica.

**VIDA ÚTIL:** 36 meses.

**PRESENTACIÓN:**

Frasco x 1 litro

**REGISTRO:** 3A4-2843-AGROCALIDAD.