

BAYTRIL® 5 % SOLUCIÓN INYECTABLE



Antibacteriano
Solución inyectable



COMPOSICIÓN: Cada ml contiene:

Enrofloxacin	(ác. 1-ciclopropil-7-(4-etil-1-piperacil)6-fluoro-1,4 dihidro-4-oxo-3 quinolin carboxílico)	50 mg
Excipientes c.s.p.....		1 ml

INDICACIONES: Por su amplio espectro de acción, así como por su farmacodinamia y farmacocinética, está indicado exclusivamente para el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por gérmenes gram-positivos, gram-negativos y mycoplasmas, ya sean éstas mixtas o sencillas.

MECANISMO DE ACCIÓN: Se caracteriza por bloquear la acción enzimática de las topoisomerasas que actúan a nivel de ácido desoxirribonucleico (ADN) durante su replicación, transcripción, recombinación y mecanismos de reparación, provocando, un efecto bactericida.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Cerdos: 1 ml por cada 20 kg de peso (2,5 mg/kg de peso) vía intramuscular por 3 días seguidos. En casos de infecciones respiratorias severas y de salmonellosis la dosis puede aumentarse a 5 mg por kg de peso cada 24 horas por 5 días seguidos.

Bovinos: 2,5 mg por kg de peso (1 ml/20 kg) vía subcutánea cada 24 horas, por tres días seguidos. En casos de Salmonellosis e infecciones severas la dosis puede aumentarse a 5 mg/kg cada 24 horas por 5 días seguidos.

Perros y Gatos: 5 mg/kg de peso (1 ml/10 kg) diariamente, vía subcutánea por 5 días seguidos. El tratamiento puede iniciarse con el producto y mantenerse con Baytril Tabletas Saborizadas.

DURACIÓN DE TRATAMIENTO: Para evitar al máximo los fenómenos de persistencia bacteriana, con las consecuentes recidivas o recaídas, se recomienda mantener una terapia por lo menos de 3 días consecutivos y en el caso de gérmenes intracelulares 5 días (Salmonella).

PRECAUCIONES: En Bovinos no administrar más de 10 ml por sitio de aplicación y en cerdos no más de 2,5 ml. No aplicar el producto en perros de razas grandes y crecimiento rápido que no hayan superado el primer año de vida y no utilizar en casos de trastornos de crecimiento del cartilago. En gatos, no exceder la dosis recomendada, puede producir efectos retino tóxicos (incluyendo ceguera). No usar en gatos menores de 8 semanas de edad. No utilizar en animales gestantes o lactantes.

En lo posible se recomienda realizar pruebas de sensibilidad microbiana.

No aplicar el producto después de la fecha de caducidad como cualquier fármaco, se recomienda guardar el medicamento alejado de los alimentos.

TIEMPO DE RETIRO: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 7 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 72 horas después de finalizado el mismo, no debe darse al consumo humano.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener entre 15°C y 30°C protegido de la luz solar.

MATERIAL DE EMPAQUE: Caja de cartón blanca con cierre manual en ambos extremos con un frasco de vidrio color ámbar con

tapa de agrafe y aluminio color verde.

VIDA ÚTIL: 36 meses.

CONCEPTO TOXICOLÓGICO: No Aplica.

PRESENTACIONES:

Caja x 1 frasco x 100 ml

Caja x 1 frasco x 50 ml

REGISTRO: 2B3-7348-AGROCALIDAD.

FABRICADO POR: BAYER KVP PHARMA - ALEMANIA

DISTRIBUIDO POR: ELANCO