

BAYTRIL® TABLETAS 150 MG SABORIZADO



Enrofloxacin
Oral



COMPOSICIÓN: Cada tableta contiene:

Enrofloxacin 150 mg
Excipientes, c.s.p. 1 tableta

INDICACIONES: Para terapia de enfermedades infecciones en perros, causadas por bacterias Gram positivas (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Corynebacterium pyogenes*, *Colstridium perfringes*); Gram negativas (*E.coli*, *Salmonella* spp., *Klebsiella* spp., *Proteus* spp., *Pateurella* spp., *Pseudomona* spp., *Brucella canis*, *Bordetella* spp., *Campylobacter* spp., *Mycoplasma* y *Rickettsias* (*Ehrlichia* spp.).

Debido a su amplio espectro, se puede utilizar **BAYTRIL® TABLETAS 150 MG SABORIZADO**, en infecciones individuales o mixtas del tracto respiratorio, urinario, gastrointestinal, así como de la piel, del canal auditivo e infecciones en heridas.

CONTRAINDICACIONES: No administrar el producto en perros de razas pequeñas y medianas menores de 1 año de edad. En perros de razas grandes con un largo periodo de crecimiento, no se debe administrar el producto hasta cumplirse los 18 meses de edad, ya que el cartílago articular puede verse afectado durante el periodo de rápido crecimiento. No utilizar en casos de trastornos de crecimiento del cartílago. No utilizar en animales gestantes o lactantes. No utilizar en animales con afecciones del sistema nervioso.

Efectos secundarios: Casos aislados de trastornos gastrointestinales.

Efectos alternos con otros medicamentos: No utilizar simultáneamente con Teofilina.

La combinaciones de **BAYTRIL® TABLETAS 150 MG SABORIZADO** con Macrólidos o Tetraciclinas, desde el punto de vista farmacológico no solo recomendables; sin embargo **BAYTRIL® TABLETAS 150 MG SABORIZADO** puede emplearse en combinación con otros antibióticos sin perder su efectividad.

El tratamiento simultaneo con sustancias que contengas Magnesio o Aluminio puede reducir la absorción de Enrofloxacin.

POSOLÓGIA, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Administrar por vía oral, aplicando la tableta directamente en la boca o mezclada en el alimento.

DOSIFICACIÓN: 5 mg de Enrofloxacin /kg p.c/día o una tableta de **BAYTRIL® TABLETAS 150 MG SABORIZADO** por cada 30 kg p.c una vez al día.

DOSIFICACIÓN DE BAYTRIL® TABLETAS 150 MG SABORIZADO:

TABLETAS	PESO
	15 kg peso corporal
	30 kg peso corporal
	45 kg peso corporal
	60 kg peso corporal
	75 kg peso corporal

La duración del tratamiento es de 5 - 10 días, dependiendo de la gravedad de la infección (Según el criterio del Médico Veterinario). En casos de Ehrlichiosis el tratamiento es por 15 días. En infecciones complejas o profundas se requieren tratamientos más extendidos y el progreso debe ser regularmente evaluado. La

selección de la dosis y duración del tratamiento debe basarse en la experiencia clínica, la severidad de la enfermedad y la susceptibilidad del patógeno. Se recomienda tratar casos de pioderma superficial por 2 a 3 semanas. En casos de pioderma profunda. el tratamiento se debe mantener por 2 a 3 semanas después que las lesiones visibles se hayan sanado. Las infecciones urinarias agudas sin complicaciones se deben tratar por 7 a 10 días, mientras que las infecciones urinarias crónicas por 3 a 4 semanas.

CONSULTE A SU MÉDICO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA/FÓRMULA/PRESCRIPCIÓN DEL MÉDICO VETERINARIO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ALMACENAMIENTO: Consérvese entre 15 °C y 30 °C.

MATERIAL DE EMPAQUE: Caja de cartón, con ambos extremos de cierre manual.

CONCEPTO TOXICOLÓGICO: No Aplica.

VIDA ÚTIL: 60 meses.

PRESENTACIÓN:

Caja x 10 tabletas.

REGISTRO: 2C1-7551-AGROCALIDAD.

FABRICADO POR: BAYER KVP PHARMA - ALEMANIA

DISTRIBUIDO POR: ELANCO