

## BAYTRIL® TABLETAS 50 MG SABORIZADO



**Enrofloxacin**  
Oral



**COMPOSICIÓN:** Cada tableta contiene:

Enrofloxacin.....50 mg  
Excipientes, c.s.p.....1 tableta

**INDICACIONES:** Para terapia de enfermedades infecciones en perros, causadas por bacterias Gram positivas (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Corynebacterium pyogenes*, *Colstridium perfringes*); Gram negativas (*E.coli*, *Salmonella* spp., *Klebsiella* spp., *Proteus* spp., *Pateurella* spp., *Pseudomona* spp., *Brucella canis*, *Bordetella* spp., *Campylobacter* spp., *Mycoplasma* y *Rickettsias* (*Ehrlichia* spp.).

Debido a su amplio espectro, se puede utilizar **BAYTRIL® TABLETAS 50 MG SABORIZADO**, en infecciones individuales o mixtas del tracto respiratorio, urinario, gastrointestinal, así como de la piel, del canal auditivo e infecciones en heridas.

**CONTRAINDICACIONES:** No administrar el producto en perros de razas pequeñas y medianas menores de 1 año de edad. En perros de razas grandes con un largo periodo de crecimiento, no se debe administrar el producto hasta cumplirse los 18 meses de edad, ya que el cartílago articular puede verse afectado durante el periodo de rápido crecimiento. No utilizar en casos de trastornos de crecimiento del cartílago. No utilizar en animales gestantes o lactantes. No utilizar en animales con afecciones del sistema nervioso. No se recomienda exceder la dosificación indicada en gatos, se ha observado que en dosis de 20 mg o más por kg de peso, eventualmente se producen trastornos de la visión.

**EFFECTOS SECUNDARIOS:** Casos aislados de trastornos gastrointestinales.

**EFFECTOS ALTERNOS CON OTROS MEDICAMENTOS:** No utilizar simultáneamente con Teofilina.

La combinaciones de **BAYTRIL® TABLETAS 50 MG SABORIZADO** con Macrólidos o Tetraciclinas, desde el punto de vista farmacológico no solo recomendables; sin embargo **BAYTRIL® TABLETAS 50 MG SABORIZADO** puede emplearse en combinación con otros antibióticos sin perder su efectividad.

El tratamiento simultáneo con sustancias que contengas Magnesio o Aluminio puede reducir la absorción de Enrofloxacin.

**POSOLOGÍA, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Administrar por vía oral, aplicando la tableta directamente en la boca o mezclada en el alimento.

**DOSIFICACIÓN:** 5 mg de Enrofloxacin /kg p.c/día o una tableta de **BAYTRIL® SABORIZADO** por cada 30 kg p.c una vez al día.

**DOSIFICACIÓN DE BAYTRIL® SABORIZADO:**

TABLETAS	PESO
	2.5 kg peso corporal
	5 kg peso corporal
	10 kg peso corporal
	15 kg peso corporal
	20 kg peso corporal

La duración del tratamiento es de 5 - 10 días, dependiendo de la gravedad de la infección (Según el criterio del Médico Veterinario). En casos de Ehrlichiosis el tratamiento es por 15 días.

CONSULTE A SU MÉDICO VETERINARIO  
VENTA BAJO RECETA/FÓRMULA/PRESCRIPCIÓN DEL MÉDICO VETERINARIO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

**ALMACENAMIENTO:** Consérvese entre 0 °C y 35 °C.

**MATERIAL DE EMPAQUE:** Caja de cartón, con ambos extremos de cierre manual.

**CONCEPTO TOXICOLÓGICO:** No Aplica.

**VIDA ÚTIL:** 60 meses.

**PRESENTACIÓN:**  
Caja x 10 tabletas.

**REGISTRO:** 2C1-4330-AGROCALIDAD.

**FABRICADO POR:** BAYER KVP PHARMA - ALEMANIA

**DISTRIBUIDO POR:** ELANCO