

BERENIL®



Antiparasitario hemático Solución inyectable



COMPOSICIÓN:

Diaminazina en solución acuosa al7%
Antipirina como estabilizante de la solución.

MODO DE ACCIÓN: Actúa directamente sobre los tripanosomas y babesias, posee además propiedades antibacterianas así como cierto efecto fungistático. Se une rápida e irreversiblemente a los tripanosomas, perdiendo éstos su infecciosidad y su movilidad provocándoles la muerte. Además bloquea su metabolismo energético. En las babesias influye sobre las citomembranas alterando definitivamente sus funciones.

INDICACIONES: Terapéutica de infecciones provocadas por babesias, tripanosomas, theilerias, causantes de las enfermedades denominadas: "Tristeza", "Mal de Caderas", "Fiebre de Garrapatas", etc. Excelente tolerancia aún en animales muy jóvenes.

DOSIS: Por cada 100 kilogramos de peso vivo: 5 ml.

ADMINISTRACIÓN: Inyecciones subcutánea (S.C.) e intramuscular (I.M.) son bien toleradas.

PRECAUCIÓN:

- No aplicar más de 10 ml por sitio para evitar irritaciones locales.

PERIODO DE RETIRO:

Carne: 20 días.

Leche: 3 días.

PRESENTACIÓN:

Frasco x 20 ml.

REGISTRO: 3A4-743-AGROCALIDAD.

ELABORADO POR: INTERVET ALEMANIA.

DISTRIBUIDO POR: IMPVET CÍA. LTDA.

Km 5,5 VÍA DAULE

Telf.: (04) 602-0410 / 09-9975-9666