BIORBOSS FARBIOVET

FARBIO PHARMA

Antiparasitario externo
Solución tópica

COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:
Cipermetrina 95%..... 20,0 g
Diclorvos..... 60,0 g
Fipronil..... 1,1 g
Vehículo c.s.p. ..... 100 g

INDICACIONES: Está indicado para la eliminación de todo tipo de ectoparásitos: Garrapatas, piojos, ácaros, moscas.
Parásitos externos: Larvas de *Dermatobia hominis*, *Hypoderma bovis* y *H. lineatum*.
Ácaros: *Chorioptes bovis*, *Sarcoptes scabiei var bovis*.
Garrapatas: *Boophilus microplus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes scapularis, I. ricinus y Dermacentor variabilis.*
Mosca: (*Cochliomya hominivorax*) ayuda en el control de la miasis cutáneas (gusanera) causada por la larva de la mosca.

DOSIS:
Para Bovinos, Equinos, Ovinos y Caprinos:
Baño y/o pulverización. Diluir 1 ml de BIORBOSS FARBIOVET en 1 litro de agua
En Porcinos: Pulverización. 4 ml de BIORBOSS FARBIOVET en 1 litro de agua.
Repetir los tratamientos de acuerdo al grado de infestación, o según la recomendación del Médico Veterinario. Generalmente se recomienda una sola dosis.
La dosis del producto debe ser aplicada con dilución en agua.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica.

CONTRAINDICACIONES: No se debe utilizar en animales con hipersensibilidad o alergia conocida a la droga. Tampoco se recomienda su uso en animales debilitados, en recuperación o geriátricos. El intervalo entre tratamientos no debe ser menor a 2 meses.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: Los estudios realizados en las especies de interés no han demostrado efectos teratogénicos a las dosis usuales. En los cerdos, no se han observado efectos en la capacidad o rendimiento reproductivos o en la sobrevida de las crías.

ADVERTENCIAS: Use guantes, especialmente cuando trata a un grupo de animales. Rocíe los animales en lugares bien ventilados. Lavarse bien las manos después del tratamiento. Evitar rociar los ojos durante la aplicación. No se recomienda en otra especie que no sea la autorizada. Evitar contaminar cursos de agua como ríos, arroyos, etc. Los piretroides se inactivan por el contacto con el aire y la exposición de la luz. La cipermectrina es inflamable y debe evitarse el contacto con oxidantes fuertes, excesivo calor, chispas y llama directa.

REACCIONES ADVERSAS: Cuando se usa en la forma aprobada, no hay efectos adversos.

TIEMPO DE RETIRO: Carne y leche 2 días.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15ºC y 30ºC. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Venta Bajo Receta Médica.

PRESENTACIONES:
Frasco x 20 ml
Frasco x 100 ml
Frasco x 250 ml
Frasco x 500 ml
Frasco x 1 litro

REGISTRO: 3B1-3B2-13498-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.
Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha
Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag
Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021
SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246
www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador