

BOBACT 8®

MSD
Salud Animal


Bacterina polivalente para la prevención de las Enfermedades clostridiales y Septicemia hemorrágica en bovinos, ovinos y caprinos
Solución inyectable


COMPOSICIÓN: Células completas y toxoide.

Contiene cultivo inactivado de:

<i>Clostridium chauvoei</i>	10 ⁷ UFC
<i>Clostridium septicum</i>	10 ⁶ UFC
<i>Clostridium novyi</i>	10 ⁶ UFC
<i>Clostridium sordelli</i>	10 ⁶ UFC
<i>Clostridium perfringens serotipo C y D</i>	10 ⁶ UFC
<i>Pasteurella multocida serotipo A y D</i>	10 ⁷ UFC
<i>Mannheimia (Pasteurella) haemolytica</i>	10 ⁷ UFC

INDICACIONES: Para la prevención del Carbunco sintomático, Edema maligno, Hepatitis necrótica infecciosa, Enterotoxemia, Riñón pulposo y Septicemia hemorrágica en bovinos, ovinos y caprinos.

Confiere inmunidad a los 8 días después de su aplicación y dura un año su protección contra las enfermedades causadas por *Clostridium* y 10 meses contra Septicemia hemorrágica.

DOSIFICACIÓN: Vacunar animales a partir de los 3 meses de edad.

Bovinos: 5 ml por animal.

Ovinos y caprinos: 2.5 ml por animal.

Para máxima protección en ganado que no se haya vacunado anteriormente, se recomienda 2 aplicaciones con un intervalo de 15 a 21 días. La revacunación se puede hacer anualmente o 3 semanas antes de los cambios estacionales, invierno a verano y viceversa, con una sola dosis.

ADMINISTRACIÓN: De preferencia Subcutánea (S.C.) o Intramuscular (I.M.).

Agítese bien el frasco antes de aplicar la vacuna.

ALMACENAMIENTO:

- Evite su contaminación.
- Utilice jeringas y agujas estériles.
- Antes de administrar, permita que el producto alcance la temperatura ambiente (18 a 25°C).

PRESENTACIONES:

Frasco x 50 ml (10 dosis)

Frasco x 250 ml (50 dosis)

REGISTRO: 4C-7529-AGROCALIDAD.

ELABORADO POR: INTERVET MÉXICO.

DISTRIBUIDO POR: IMPVET CÍA. LTDA.

Km 5,5 VÍA DAULE

Telf.: (04) 602-0410 / 09-9975-9666