

## BONGO CACHORROS



**Antiparasitario interno para cachorros caninos y felinos**  
Suspensión oral



**COMPOSICIÓN:** Cada ml contiene:

Pamoato de Pirantel  
(equivalentes a pirantel 5 mg) ..... 14,40 mg  
Fenbendazol ..... 50 mg  
Aceite de hígado de bacalao ..... 40 mg  
Excipientes c.s.

**INDICACIONES:** **Bongo Cachorros** está indicado en el tratamiento y control de los siguientes parásitos en caninos y felinos:

### PARÁSITOS DE CANINOS

**Nematodos:** *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Trichuris vulpis*, *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma braziliense*, *Uncinaria stenocephala*, *Physaloptera* spp., *Trichuris vulpis*.

**Protozoos:** *Giardia* spp.

### PARÁSITOS DE FELINOS

**Nematodos:** *Toxocara cati*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Physaloptera* spp.

**Protozoos:** *Giardia* spp.

**DOSIS Y MODO DE EMPLEO:** **Bongo Cachorros** se puede administrar a partir de las 2-3 semanas de edad, en dosis de 15 mg de pamoato de pirantel (5 g de pirantel como base) y 50 mg de fenbendazol por cada kg de peso como única dosis, equivalentes a 1 ml por cada kg de peso. Para el control de nematodos, una sola dosis es suficiente. No es necesario ayuno previo o dieta especial. Para el control de *Giardia* tanto en cachorros como en animales adultos se debe administrar 1 ml por cada kg de peso durante 3 días seguidos.

Tanto para el control de nematodos como para el de *Giardia*, es aconsejable repetir el tratamiento a los 15 días.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Vía oral.

**PRECAUCIONES:** USO VETERINARIO.

### PRESENTACIÓN:

Frasco x 20 ml.

**REGISTRO:** 3A1-3A4-14077-AGROCALIDAD

**ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR:** LABORATORIOS LIFE  
ECUADOR