

## BONGO FLEALESS SPRAY



**Pulguicida – garrapaticida**  
Uso externo



**COMPOSICIÓN:** Cada 100 ml de solución contiene:

Fipronil ..... 0,25 g  
Vehículo y excipientes c.s.

**INDICACIONES:** **Bongo Flealess Spray** está indicado para el control de parásitos externos en perros y gatos. Se recomienda especialmente contra:

**Pulgas:** *Ctenocephalides canis* (pulga del perro), *Ctenocephalides felis* (pulga del gato).

**Garrapatas:** *Rhipicephalus sanguineus* (garrapata marrón del perro), *Dermacentor reticulatus*, *Ixodes ricinus*.

**Piojos:** *Trichodectes canis*.

**Ácaros:** *Trombicula autumnalis* (trombiculosis), *Otodectes cynotis* (Sarna de las orejas).

**DOSIS Y MODO DE EMPLEO:** No bañar al animal 48 horas antes o después de la aplicación del producto. Rociar toda la superficie del animal, manteniendo el envase a una distancia aproximada de 20 cm. Cuidar que el producto no llegue directamente a ojos, nariz, boca y oídos. La dosis recomendada de **Bongo Flealess Spray** es de 3 a 6 ml de la solución por kilo de peso del animal, equivalente a 5 a 10 pulsaciones por kilo de peso del animal. (Una pulsación equivale a 0,6 ml de solución en promedio). Utilizando guantes frotar a contrapelo para que el producto entre en contacto con la piel. Dejar secar el animal evitando que se lama. Cachorros y gatitos que estén todavía con su madre y a los que se aplique el producto, deben mantenerse alejados de ella hasta que estén completamente secos para prevenir que pueda ingerir el producto al lamérselos.

Puede usarse en hembras preñadas y en lactancia. También en cachorros a partir de las 4 semanas de edad y en gatitos a partir de las 8 semanas de edad.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Uso externo. Administrar sobre la piel.

**PRECAUCIONES:** No administrar a animales enfermos, debilitados y/o con deficiencias nutricionales severas. No utilizar en conejos.

**PRESENTACIÓN**

Envase x 120 ml.

**REGISTRO:** 3B-14144-AGROCALIDAD

**ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR:** LABORATORIOS LIFE ECUADOR