

BRAX-T



Analgésico, antipirético y antiinflamatorio
Solución oral



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Ácido Acetilsalicílico 40 g
Vehículo c.s.p 100 ml

INDICACIONES: Es un antiinflamatorio, analgésico, antipirético que puede ser administrado a aves y en cerdos. Está indicado en el tratamiento de los procesos febriles que se producen en las enfermedades de origen viral o bacteriano por movilización, des-pique o vacunaciones.

BRAX-T mejora el estado general de las aves, en procesos infecciosos, inflamatorios e incluso en estrés por calor. Las aves al mejorar su estado general, vuelven a los niveles de ingestión normales, logrando una rápida recuperación de las producciones.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN DE BRAX T :

Dosis de referencia: 100 mg/kg de peso vivo		
ESPECIE	En porcinos administrar: 2.5 ml/10 kg de peso vivo	
PORCINOS	en 1 litro de agua de bebida cada 12 horas.	
Dosis referencia aves: 20 a 40 mg/kg		
ESPECIE	EDAD SEMANAS	25-50 ml/100 l de agua
AVES	1	
	2 - 3 - 4	20-40 ml/100 l de agua
	5 - 6	15-30 ml/100 l de agua
Durante 3 días o hasta la remisión de los síntomas.		

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

PREPARACIÓN: Ninguna. Producto listo para su aplicación.

ADVERTENCIAS: No administrar en otras especies que no sea la autorizada. El producto posee en su formulación estabilizantes de olor característico que en ocasiones provocan cambios en las características del producto, sin afectar la concentración de principio activo dentro del periodo de validez declarado.

REACCIONES ADVERSAS: No han sido reportadas a dosis terapéuticas.

Las manifestaciones tóxicas por sobredosis incluyen principalmente: erupciones cutáneas, edema, asma, hemorragias, ulceraciones gastrointestinales y vómitos.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: Los salicilatos son posibles teratogénicos y han mostrado demorar la presentación del trabajo de parto; su uso debe ser evitado durante la gestación, en particular en sus estadios finales.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: No se recomienda su uso en conjunto con otros fármacos ulcerogénicos, ni fármacos que puedan causar coagulopatías e incrementar el riesgo de sangrados.

TIEMPO DE RETIRO: Aves: Carne 5 días y huevos 7 días/Porcinos: Carne 2 días.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15 y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Frasco x 1 000 ml.
Galón x 3.8 litros.
Caneca x 20 litros.

REGISTRO: 8A4-9444-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador