

## BRON TIL



**Antibacteriano**  
Solución oral



### COMPOSICIÓN:

Cada ml contiene:  
Tilmicosina fosfato ..... 250 mg  
Excipientes c. s. p. .... 1 ml

**INDICACIONES:** La tilmicosina corresponde a un macrólido semisintético, con actividad antimicoplásmica y antibacteriana, las mayores concentraciones se hallan en el tejido pulmonar; siendo eficaz en el control y tratamiento de enfermedades respiratorias en aves y porcinos.

### USO VETERINARIO.

#### DOSIS:

Vía oral disuelto en el agua de bebida.

**Aves:** Dosis 15 – 20 mg/kg; 0.3 ml de **BRON TIL** por litro de agua (75 mg/l), cada 24 horas, por 3 a 5 días consecutivos.

**Porcinos:** Dosis 10 – 20 mg/kg; 1 ml de **BRON TIL** por litro de agua (250 mg/l), cada 24 horas, por 5 días consecutivos.

#### PRECAUCIONES:

- No administrar en aves productoras de huevo para consumo humano.
- Las principales causas de resistencia antibacteriana, corresponden a la subdosificación o sobredosificación.
- No administrar el producto después de la fecha de caducidad.
- Puede existir un efecto antagónico si existe una administración simultánea de un macrólido con cloranfenicol.
- Venta bajo prescripción Médica Veterinaria.

#### ADVERTENCIAS:

- No está aprobado su uso en vacas lactantes, ovejas y cabras.
- No administrar a equinos, puede provocar la muerte, ya que tilmicosina produce toxicidad cardíaca.
- No se ha demostrado el uso seguro de tilmicosina en hembras gestantes o en reproductores.
- El producto debe ser administrado exclusivamente por vía oral.
- Una vez preparada la solución administrar inmediatamente y no guardar sobrantes.
- Evitar el contacto con los ojos.

#### RECOMENDACIONES:

- Se recomienda revisar el pH del agua, dado que puede afectar la solubilidad del principio activo, biodisponibilidad y estabilidad.
- La limpieza de las tuberías, bebederos y otros es fundamental para la eficacia del tratamiento.
- No use recipientes oxidados para el agua medicada ya que puede alterar la integridad del producto.
- Es un asunto de responsabilidad.
- Administrar antibacterianos a las dosis terapéuticas para lograr concentraciones plasmáticas y tisulares óptimas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:** Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura entre 15°C y 30°C, protegidos de la luz.

#### TIEMPO DE RETIRO:

**Aves:** 9 días.

**Porcinos:** 7 días.

#### PRESENTACIONES:

Frasco x 100 ml

Frasco x 500 ml

**REGISTRO:** Ecuador Reg. No. 6C - 14993 - AGROCALIDAD

**ELABORADO POR:** JAMES BROWN PHARMA

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23.5, Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pífo. Quito – Ecuador - PBX: (593-2) 399-7000 - [www.jamesbrownpharma.com](http://www.jamesbrownpharma.com)