

## BRONKOXT



**Expectorante mucolítico**  
Solución oral



**COMPOSICIÓN:** Cada 100 ml contiene:

Bromhexina ..... 0,6 g  
Vehículo c.s.p ..... 100 ml

**INDICACIONES:** Es un expectorante mucolítico de acción directa. La bromhexina, produce aumento de la cantidad de las secreciones traqueo-bronquiales ya que esta disminuye la viscosidad de la secreción lo que permite una rápida evacuación.

**BRONKOXT** oral está indicado en el tratamiento de todas las afecciones del tracto respiratorio, de naturaleza infecciosa o no, agudas o crónicas que cursan con secreción de moco. Cuando la enfermedad es infecciosa se debe acompañar con antibióticos.

DOSIS (REFERENCIA 1 000 AVES)		
0.5 mg Bromhexina/kg p.v.		aves menos de 10 semanas
1.0 mg Bromhexina/kg p.v.		aves más de 10 semanas
AVES	EDADES SEMANAS	PESO PROMEDIO
16.5 ml/56 l agua	0-1	165 g
40 ml/125 l agua	1-2	400 g
90 ml/174 l agua	2-3	900 g
140 ml/226 l agua	3-4	1 400 g
333 ml/264 l agua	10-más	2 000 g
<b>PORCINOS</b>	(1 mg Bromhexina/kg p.v.)	Lechones: 5 ml/animal Cerdos: 15 ml/animal
<b>CANINOS FELINOS</b>	1 mg Bromhexina/kg p.v. 2 veces al día	0.16 ml <b>BRONKOXT</b> /kg p.v.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.  
Administrar de 3 a 5 días o según criterio del Médico Veterinario.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Vía Oral. Está destinado para aplicación por vía oral directa o en el agua de bebida.

**PREPARACIÓN:** Puede ser mezclado con agua de bebida.

**CONTRAINDICACIONES:** No administrar en individuos con úlceras gástricas.

**USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA:** No usar en gallinas productoras de huevo destinada al consumo humano. La bromhexina puede atravesar la barrera placentaria, así mismo pasa a la leche materna.

**ADVERTENCIAS:** Usar soluciones frescas. Se recomienda no administrar a gallinas productoras de huevos para consumo humano.

**REACCIONES ADVERSAS:** Podría presentarse animales con insuficiencia hepática y renal grave.

**INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN:** Riesgos de estasis del moco por inhibición del reflejo de la tos con: Antitusivos (anticolinérgicos, antihistamínicos etc.). Efecto antagonizado al inhibir secreción bronquial con: Anticolinérgicos, antihistamínicos H<sub>1</sub>, antidepresivos tricíclicos, neurolépticos.

**TIEMPO DE RETIRO:**

**Aves:** carne 5 días y huevos 7 días.

**Porcinos:** carne 2 días.

**ALMACENAMIENTO:** Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C a 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

**DECLARACIÓN DE VENTA:** Con prescripción Médico Veterinaria.

**PRESENTACIONES:**

Frasco x 50 ml + jeringa dosificadora.

Frasco x 100 ml.

Frasco x 1 000 ml.

Galón x 3,8 litros.

Caneca x 20 litros.

**REGISTRO:** 6E-12472-AGROCALIDAD

**ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR:** FARBIOPHARMA S.A.

**Dirección:** Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador