

## BRONQUITIS FARBIOVET



**Vacuna aviar**  
Liofilizado + diluyente



### FÓRMULA: Cada dosis contiene:

Virus del serotipo Massachusetts de la enfermedad de Bronquitis.....  $\geq 1 \times 10^4$  DIE<sup>50</sup>/dosis  
Excipientes c.s.p..... 1 dosis

**ESPECIES:** Aves.

### DOSIS DE BRONQUITIS FARBIOVET:

ESPECIE	DOSIS	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
<b>AVES</b> entre 2 y 4 semanas de edad	1 gota equivalente a 1 dosis (0.05 ml)	Intranasal, intraocular, oral o aerosol.

**VACUNACIÓN:** Para mejorar inmunización revacunar a los 7 días de la primera vacunación, luego cada 6 meses.

**INDICACIONES DE USO:** Vacuna indicada para la prevención de la Bronquitis infecciosa en aves.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Intranasal, Intraocular, Oral o en Aerosol.

**DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD:** La Bronquitis Infecciosa (BI) es una enfermedad viral que afecta a aves (pollos y gallinas) de todas las edades. Es causada por el virus de la Bronquitis Infecciosa (VBI).

Afecta al tracto respiratorio y urogenital, provocando signos como tos, descargas nasales, lagrimeo, disminución en la postura de huevos, entre otros.

Si llega a causar daño a nivel renal se incrementa el consumo de agua, diarrea moderada, deshidratación y una elevada mortalidad.

**MECANISMO DE ACCIÓN:** Estimula una replicación viral tenue en el animal, pero no provoca una enfermedad clínica, brindado así inmunidad activa y protegiendo a las aves de una exposición natural al virus de la Bronquitis infecciosa.

### PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES:

- Aplicar la vacuna inmediatamente después de su reconstitución, ya que los rayos solares deterioran el producto.
- No guardar sobrantes, los restos de la vacuna deben ser desechados. No congelar.
- No vacunar animales enfermos, administrar solo a animales sanos.
- En caso de contacto accidental con el ojo humano puede presentar un cuadro clínico de conjuntivitis que dura de 2 a 3 días.

**INTERACCIONES:** No reportado.

### REACCIONES ADVERSAS:

- En casos extremadamente escasos, puede presentarse una reacción alérgica a la aplicación de la vacuna.
- Se pueden presentar ligeras dificultades respiratorias después de la vacunación, estas suelen desaparecer en un plazo de dos semanas.
- La vacunación de emergencia en gallinas ponedoras no inmunizadas puede provocar la caída en producción de huevos la cual puede volver a restablecerse.

**RETIRO:** Ninguno.

### PRESENTACIONES:

Frasco x 50 dosis  
Frasco x 100 dosis

Frasco x 500 dosis  
Frasco x 1 000 dosis  
Frasco x 2 500 dosis

**REGISTRO:** 4A-11153-AGROCALIDAD

**ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR:** FARBIOPHARMA S.A.

**Dirección:** Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador