

CALCIO ORAL



Reconstituyente
Solución oral



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Gluconato de Calcio	18,2 g
Cloruro de Magnesio	1,6 g
Fosforilcolamina	0,75 g
Vehículo c.s.p	100 ml

INDICACIONES: Como suplemento de calcio, fósforo, magnesio para la fiebre de leche, hipocalcemia, raquitismo, animales en convalecencia.

DOSIS DE CALCIO ORAL:

ESPECIE	EDAD	DOSIS
BOVINOS	Ternero	100 ml
PORCINOS	Adulto	100 ml
CAPRINOS	Adulto	100 ml
OVINOS	Adulto	100 ml
CANINOS	Adulto	50 ml
CANINOS	Cachorro	5 ml

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

CONTRAINDICACIONES: El calcio está contraindicado en pacientes con fibrilación ventricular o hipercalcemia.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA:

Aunque no se ha demostrado si la administración del productos de calcio es inocua durante la gestación, a menudo se usa antes, durante y después del parto en vacas, ovejas y perras para tratar la paresia parturienta secundaria a hipocalcemia.

ADVERTENCIAS: En toda administración de calcio se recomienda monitorear la frecuencia cardíaca y respiratoria.

El calcio debe usarse con gran cautela en pacientes que toman glucósidos digitálicos o tienen enfermedad cardíaca o renal.

REACCIONES ADVERSAS: La administración de calcio puede causar hipercalcemia, en especial en pacientes con enfermedad cardíaca o renal. La administración oral puede causar irritación gastrointestinal y/o constipación.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN:

La administración oral de calcio puede conducir a un aumento de la concentración sérica de magnesio y/o calcio, en particular en pacientes con insuficiencia renal.

La administración oral de calcio puede disminuir la cantidad de tetraciclinas o fluoroquinolonas absorbidas a través del tracto gastrointestinal; separar la administración de estas drogas por un lapso de 2 horas, si es posible.

Diuréticos derivados de las tiacidas su uso en conjunto con grandes dosis de calcio puede causar hipercalcemia.

La excesiva ingesta de Vitamina A puede estimular la pérdida de calcio desde los huesos y causar hipercalcemia.

El uso concurrente de grandes dosis de vitamina D o sus análogos puede causar un aumento de la absorción de calcio e inducir hipercalcemia.

TIEMPO DE RETIRO: Ninguno.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera

del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Frascos x 120 ml

Frascos x 490 ml

REGISTRO: 9A2-10813-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador