

## CALCIO TAD-EC GEL®



**Calcio y Magnesio**  
*Suspensión oral*



**COMPOSICIÓN:** Contiene por ml de solución:

Cloruro de Calcio Dihidrato ..... 500 mg  
Cloruro de Magnesio Hexahidrato ..... 80 mg

**INDICACIONES:** Tratamiento de deficiencias de Calcio y Magnesio en bovinos.

**DOSIFICACIÓN:** Administrar 500 ml de **CALCIO TAD-EC GEL 12** horas después de la aplicación intravenosa de **CALCIO TADEC 50**, para mantener los niveles apropiados de Ca y Mg.

**PREVENCIÓN DE FIEBRE DE LECHE:**

500 ml de **CALCIO TAD-EC GEL** aproximadamente 12 horas antes del parto.

500 ml de **CALCIO TAD-EC GEL** durante el parto.

500 ml de **CALCIO TAD-EC GEL** 12 horas y 24 horas después del parto.

**EFFECTOS SECUNDARIOS:** Eventualmente puede observarse una disminución del apetito o leve diarrea debido a irritación gástrica, estos síntomas desaparecen sin necesidad de tratamiento.

**PRECAUCIONES:**

- No administrar si el animal no tiene reflejo de deglución, para evitar que el producto ingrese accidentalmente a la tráquea y pulmones.
- No utilizar en ausencia de motilidad ruminal.
- Mantener a una temperatura de 25°C. No congelar.

**PRESENTACIÓN:**

Botella plástica x 500 ml.

**REGISTRO:** RIP-FAR-30.

**ELABORADO POR:** DUTCH FARM INT. - HOLANDA

**DISTRIBUYE PARA EL ECUADOR:** TADEC CíA. LTDA. Ambato - Quito - Guayaquil - Cuenca - Balsas - Sto. Domingo.  
Servicio al cliente: +593 32-855 035