

CALCIO TADEC 50[®]



Calcioterapia Inyectable



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Gluconato de calcio 1 H₂O 3.10 g corresponde..... 4.56 gCa
 Calcioborogluconato..... 42.90 g
 Hidróxido de calcio 1.32 g
 Cloruro de magnesio 6.50 g corresponde..... 0.78 g Mg
 2-aminoetil-dihidrógeno 0.60 g corresp fosfato.. 0.132 g P
 P-Éster metílico del ácido hidroxibenzoico:..... 0.10 g
 Solución acuosa para administración: Intravenosa (I.V.), subcutánea (S.C.), intramuscular (I.M) e intraperitoneal.

CARACTERÍSTICAS: Las nuevas propiedades físico-químicas llevan a una mejora de su farmacodinamia que ofrece ventajas esenciales en el manejo del preparado de la práctica veterinaria. El bajo contenido de ácido bórico garantiza una buena compatibilidad general, incluso en caso de repetición. Debido a la buena tolerancia comprobada se ve tan solo un recargo mínimo sobre el corazón y la circulación sanguínea.

INDICACIONES: Paresia hipocalcémica: Antes, durante y después del parto, o durante la lactancia (paresia del parto, fiebre de lactancia). Paraplejias del ganado bovino, ovejas y cabras (especialmente durante la preñez) debido a enfermedades deficitarias y carenciales. Raquitismo, osteomalacia, debilidades vitales del recién nacido, acetonemias. Alergias, intoxicaciones, neurosis, eclampsia de las cerdas y de las perras lactantes. Coadyuvante en el tratamiento de la esterilidad.

DOSIFICACIÓN:

Vaca: 100 - 150 ml/500 kg peso.

Ternero, oveja, cabra, cerdo: 1.5 ml/50 kg peso.

Lechón: 1.5 ml/10 kg peso.

Perro: 2 ml/10 kg peso.

Gato: 0.5 ml/2.5 kg peso.

PRESENTACIÓN:

Frasco x 100 ml.

REGISTRO: 10A-11145-AGROCALIDAD.

ELABORADO POR: DUTCH FARM INT. - HOLANDA

DISTRIBUYE PARA EL ECUADOR: TADEC CÍA. LTDA. Ambato - Quito - Guayaquil - Cuenca - Balsas - Sto. Domingo.
 Servicio al cliente: +593 32-855 035