

CANIDENT



Antiséptico
Crema dental



FÓRMULA: Cada 100 g contiene:

Clorhexidina gluconato 0.025 g
Saborizante y excipientes c.s.p. 100 g

ESPECIES: Equinos, caninos y felinos.

DOSIS DE CANIDENT: Uso externo. Se aplica después de humedecer la dentadura, realizando un buen cepillado por toda la superficie dental. Se recomienda la primera vez dar masajes en las encías y dientes con el dedo, lo que ayudará a que el animal se adapte a esta práctica de limpieza.

INDICACIONES DE USO: Crema dental antiséptica indicada para el control de afecciones como: gingivoestomatitis, gingivitis, halitosis y periodontitis; así como para la conservación y limpieza de la dentadura de equinos, caninos y felinos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica (cavidad oral).

FARMACOCINÉTICA: La absorción de clorhexidina a través de la piel es mínima, en caso de que se produzca una absorción sistémica, la eliminación se produce a través de la bilis o a nivel renal. La absorción digestiva es prácticamente nula, la dosis ingerida se elimina en un 90% sin alteración por las heces.

MECANISMO DE ACCIÓN: La clorhexidina es un antiséptico tópico, posee actividad contra muchas bacterias, pero, aparentemente, no tiene actividad predecible contra *Pseudomonas* o *Serratia* spp. Debido a que causa menos sequedad y, por lo general, es menos irritante que el peróxido de benzoilo, es usada algunas veces en pacientes que no pueden tolerar este último.

La clorhexidina posee algunos efectos residuales y puede permanecer activa sobre la piel después del enjuague.

A las concentraciones usuales, la clorhexidina actúa dañando las membranas citoplasmáticas bacterianas. La actividad antifúngica puede ser obtenida con una concentración igual o superior al 2%.

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES:

- Mantener el producto alejado de los ojos, ya que la clorhexidina los puede dañar.
- Se sugiere que los propietarios o el médico laven sus manos después de la aplicación.
- No se recomienda su uso en otra especie que no sea la autorizada.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: Evitar la administración concurrente con otro gel dental.

REACCIONES ADVERSAS: La hipersensibilidad y las reacciones irritativas locales son posibles. La posibilidad de irritación se incrementa a medida que aumenta la concentración de la clorhexidina; no se recomienda su uso durante un tiempo prolongado, en particular sobre tejido de granulación.

RETIRO: No aplica.

PRESENTACIÓN:

Tubo x 50 g

REGISTRO: 2A-9973-AGROCALIDAD

ELABORADO POR: FARBIOPHARMA S.A. para INPEL QUALITY

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Píntag

Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador